

Ikervis 1 mg/ml krople do oczu 30 pojemników

Nasza cena: 117,52 zł

Opis słownikowy

Dawka	1 MG/ML
Opakowanie	*30 POJ.
Postać	KROP.DO OCZU
Producent	SANTEN OY FINLANDIA [FI]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	CICLOSPORINUM

Opis produktu

Opis

Ikervis 1 mg/ml krople do oczu postaci mlecznobiałej emulsji stosowane są do leczenia ciężkiego zapalenia rogówki u dorosłych pacjentów z zespołem suchego oka, u których nie nastąpiła poprawa pomimo stosowania preparatów sztucznych łez.

Dawkowanie:

Leczenie produktem leczniczym IKERVIS musi być rozpoczęte przez okulistę lub innego profesjonalnego członka personelu medycznego z odpowiednimi kwalifikacjami w dziedzinie okulistyki.

Dawkowanie:

Dorośli

Zalecana dawka to jedna kropla produktu IKERVIS raz na dobę, podawana do chorego oka (oczu) przed snem. Odpowiedź na leczenie należy ponownie oceniać co najmniej co 6 miesięcy. W razie pominięcia dawki należy kontynuować leczenie podając następną dawkę o zwykłej porze. Należy pouczyć pacjentów, aby nie podawali więcej niż jedną kroplę do chorego oka (oczu).

Pacjenci w podeszłym wieku

Populacja pacjentów w podeszłym wieku była oceniana w badaniach klinicznych. Nie ma konieczności dostosowania dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Nie badano działania produktu IKERVIS u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek. Jednakże stosowanie produktu w tych populacjach nie wymaga szczególnej uwagi.

Dzieci i młodzież

Stosowanie produktu leczniczego IKERVIS w leczeniu ciężkiego zapalenia rogówki u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z zespołem suchego oka, u których nie doszło do poprawy pomimo stosowania preparatów sztucznych łeznie jest właściwe.

Sposób podania:

Podanie do oka.

Środki ostrożności, które należy podjąć przed podaniem produktuleczniczego:

- Należy pouczyć pacjentów o konieczności umycia rąk przed podaniem leku.
- Przed podaniem należy delikatnie wstrząsnąć pojemnikiem jednodawkowym.
- Wyłącznie do jednorazowego użycia.
- Zawartość każdego pojemnika jednodawkowego wystarcza do podanialeku do obu oczu.
- Wszystkie niewykorzystane resztki emulsji należy natychmiast usunąć.
- Należy polecić pacjentom zastosowanie okluzji przewodu nosowo-łzowego oraz zamknięcie powiek na 2 minuty po zakropleniu leku, aby zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe leku. Może to prowadzić do zmniejszenia częstości występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych i zwiększenia skuteczności miejscowego działania leku
- Jeśli stosuje się więcej okulistycznych produktów leczniczych podawanych miejscowo, to każdy z nich należy podawać z przynajmniej 15-minutowym odstępem. Produkt IKERVIS powinien być podany jako ostatni.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynne lub podejrzanewane zakażenie oka lub jego okolicy.

Skład:

Jeden ml emulsji zawiera 1 mg cyklosporyny(ciclosporin). Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jeden ml emulsji zawiera 0,05 mg chlorku cetalkoniou.

Substancją czynną leku jest cyklosporyna.

Jeden mililitr leku IKERVIS zawiera 1mg cyklosporyny.

Pozostałe składniki to:

triglicerydy średniołańcuchowe, chlorek cetalkonium, glicerol, tyloksapol, poloksamer188, wodorotlenek sodu (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.