

Iladian Direct Plus, 10 tabletek dopochwowych

Nasza cena: 23,80 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	TABL.DOPOCH.
Producent	AFLOFARM SP.Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis

Iladian Direct Plus, 10 tabletek dopochwowych

Upławy, pieczenie, swędzenie, uczucie dyskomfortu okolic intymnych – to oznaki infekcji. Przyczyną infekcji mogą być bakterie lub grzyby. Niezależnie od źródła infekcji, warto sięgnąć po Iladian direct plus.

Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, grzybiczych jak i mieszanych oraz pomaga zapobiec rozwojowi zakażenia.

Czym jest Iladian direct plus?

Wyrób medyczny Iladian direct plus to tabletki dopochwowe, które poprzez przywrócenie lub utrzymanie fizjologicznego pH pochwy stwarzają warunki hamujące rozwój bakterii odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju Candida. Iladian direct plus działa zatem na trzy rodzaje infekcji:

- bakteryjne,
- grzybicze,
- mieszane: gdy infekcja jest powodowana jednocześnie przez bakterie i przez grzyby.

Dla kogo jest przeznaczony?

Iladian direct plus przeznaczonych jest dla kobiet, które narażone są na wszelkie zaburzenia flory bakteryjnej, wynikające zarówno z infekcji bakteryjnych, grzybiczych, mieszanych, jak i złych nawyków higienicznych. Jego stosowanie wskazane jest w:

- zapobieganiu i wspomaganie leczenia bakteryjnego, grzybiczego czy mieszanego zakażenia pochwy,
- łagodzeniu dolegliwości takich jak suchość i uczucie napięcia błony śluzowej pochwy,
- w trakcie i po zakończeniu stosowania doustnych antybiotyków i preparatów przeciwbakteryjnych,
- w okresie okołomenopauzalnym (klimakterium),
- kobietom uczęszczającym na basen, często podróżującym, korzystającym z jacuzzi, sauny i solarium

Jaki jest skład i działanie Iladian direct plus?

Iladian direct plus to jedyne tabletki dopochwowe zawierające:

- inulinę – która wspomaga namnażanie bakterii tworzących naturalną florę bakteryjną pochwy
- kwas L-askorbinowy – który zakwasza środowisko pochwy hamując rozwój niepożądanych drobnoustrojów: bakterii i grzybów
- witaminę E i kwas hialuronowy – które nawilżają błonę śluzową pochwy zmniejszając podatność na mikrourazy.

Jak stosuje się Iladian direct plus?

Iladian direct plus może być stosowany zarówno profilaktycznie, jak i we wspomaganiu leczenia.

Podczas wspomagania leczenia bakteryjnego zakażenia pochwy należy stosować 1 tabletkę dopochwową raz dziennie (na noc) przez 7 do 10 dni. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.

W profilaktyce należy stosować 1 tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu. Nie stosować na uszkodzone błony śluzowe. W przypadku występowania upławów z krwią nie stosować wyrobu Iladian direct plus i skonsultować się z lekarzem. Wyrób medyczny Iladian direct plus nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi preparatami do stosowania dopochwowego. Cięża i karmienie piersią: przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

To jest wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.