

# Immunofort płyn doustny, 125 g

Nasza cena: 21,89 zł

## Opis słownikowy

Producent	LEKI NATURY POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty



## Opis produktu

### Opis

## Immunofort płyn doustny, 125 g

Immunofort jest lekiem roślinnym, tradycyjnym i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

### Dawkowanie - Immunofort mikstura wzmacniająco-uodparniająca 125 g

Dorośli i młodzież powyżej 12 r.ż.: 3-5 ml leku do 4 razy dziennie, 30 minut przed jedzeniem, rozpuszczając lek w małej ilości wody. Rozpocząć terapię preparatem przy pierwszych objawach infekcji, kontynuując leczenie nie dłużej niż 10 dni.

### Składniki - Immunofort mikstura wzmacniająco-uodparniająca 125 g

100 g produktu zawiera :

Sok z ziela jeżówki purpurowej 40 g, sok z owoców aronii 30 g, sok z korzenia łopianu 10 g, ekstrakt z kwiatów rumianku 10 g, sok z ziela pokrzywy 10g.

Zawartość etanolu: 28-36% (v/v).

### Wskazania - Immunofort mikstura wzmacniająco-uodparniająca 125 g

Immunofort jest stosowany pomocniczo w infekcjach górnych dróg oddechowych, gardła, migdałków, jamy ustnej i zatok; w skłonnościach do częstych przeziębień oraz zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych; w źle gojących się ranach.

### Przeciwwskazania - Immunofort mikstura wzmacniająco-uodparniająca 125 g

Nie stosować w przypadku:

- postępujących chorób układowych (np gruźlica, stwardnienie rozsiane), zakażenia wirusem HIV oraz innych chorobach autoimmunologicznych i z autoagresji
- w onkologii u pacjentów leczonych cytostatykami
- u pacjentów po przeszczepach narządów
- w chorobach krwi, dotyczących układu białych krwinek
- w przypadku chorób alergicznych (np. pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, astma)

### Przeciwwskazania - Immunofort mikstura wzmacniająco-uodparniająca 125 g

Jak każdy lek, Immunofort może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na jeżówkę, charakteryzujące się wysypką, pokrzywką, skurczem oskrzeli, astmą i reakcją anafilaktyczną. Jeżówka może wywołać reakcje alergiczne u osób z atopią. Stwierdzono także związek z chorobami autoimmunologicznymi. W wyniku długotrwałego stosowania może wystąpić leukopenia. W przypadku wystąpienia tych lub innych objawów niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem.

### Uwagi

Nie stosować w trakcie ciąży i okresie karmienia piersią.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**