

Inaldin aerozol doustny 1,5mg/ml 30ml



Nasza cena: 19,63 zł

Opis słownikowy

Dawka	1,5 MG/ML
Opakowanie	30ml
Postać	AER.DOUSTNY
Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED IRLANDIA [IE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	BENZYDAMINUM

Opis produktu

OPIS

INALDIN Gardło, 1,5 mg/ml
aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór
Wielkość opakowania: 30 ml

SKŁAD

1,5 mg/ml benzydaminu chlorowodoru (Benzydaminu hydrochloridum)

DZIAŁANIE LEKU

Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

DAWKOWANIE

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

od 4 do 8 dawek aerozolu (zawierają od 1,02 do 2,04 miligramów benzydaminu chlorowodoru, co odpowiada od 0,91 do 1,82 miligramów benzydaminu) od 2 do 6 razy na dobę; nie częściej niż co 1,5 – 3 godziny.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

4 dawki aerozolu (zawierają 1,02 miligramów benzydaminu chlorowodoru, co odpowiada 0,91 miligramów benzydaminu) od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5 – 3 godziny.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

1 dawka aerozolu na 4 kg masy ciała (zawiera 0,26 miligramów benzydaminu chlorowodoru, co odpowiada 0,23 miligramów benzydaminu na 4 kg masy ciała) od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5 – 3 godziny. Jednorazowo nie należy stosować więcej niż 4 dawki (zawierają 1,02 miligramów benzydaminu chlorowodoru, co odpowiada 0,91 miligramów benzydaminu).

Osoby w podeszłym wieku

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania. Nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Leczenie nie może przekraczać 7 dni.

Sposób podawania

Podanie dogardłowe.

Ustawić końcówkę dozownika w pozycji poziomej. Jeśli produkt stosuje się po raz pierwszy, trzymając butelkę w pozycji pionowej, należy mocno nacisnąć dozownik kciukiem bądź palcem wskazującym. Czynność należy powtórzyć 5 razy w celu uzyskania prawidłowego rozpylania. Jeśli lek stosuje się po raz kolejny, dozownik należy nacisnąć 2 razy. Następnie należy skierować końcówkę dozownika do jamy ustnej i nacisnąć dozownik.

WSKAZANIA

INALDIN Gardło jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła. Działa miejscowo przeciwzapalnie i przeciwbólowo oraz znieczulająco na błonę śluzową jamy ustnej, przynosząc szybką ulgę.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE / SKUTKI UBOCZNE

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). – reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko (< 1/10 000) – skurcz krtani

Zaburzenie żołądka i jelit

Rzadko (\geq 1/10 000 do < 1/1000) – pieczenie i suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (\geq 1/1000 do < 1/100) – nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko (< 1/10 000) – obrzęk naczynioruchowy

Wkrótce po przyjęciu leku może wystąpić uczucie drętwienia lub pieczenia w jamie ustnej lub gardle. Taka reakcja jest związana z normalnym działaniem leku i ustępuje po krótkim czasie. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić nudności lub wymioty, które są wywołane przez odruch podrażnienia gardła, związany z przyjęciem leku. Objawy te ustępują samoistnie po przerwaniu przyjmowania leku.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA LEKU

Należy unikać kontaktu produktu z oczami.

U niewielu pacjentów może wystąpić owrzodzenie policzków lub gardła spowodowane przez ciężką chorobę. Dlatego pacjenci, u których objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 3 dni, lub u których wystąpi gorączka lub inne objawy, muszą zasięgnąć odpowiedniej porady lekarza lub dentystry.

Długotrwałe stosowanie leku może wywoływać reakcje alergiczne. Jeśli to nastąpi, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego i skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniej terapii.

Nie zaleca się stosowania benzydaminu w przypadku nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową lub chorobami alergicznymi w wywiadzie, ponieważ u tych osób może wystąpić skurcz oskrzeli.

Ten produkt leczniczy zawiera metylu parahydroksybenzoatan (E 218) (patrz punkt 2), który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ten produkt leczniczy zawiera 81,40 mg alkoholu (etanolu) w każdym mililitrze co odpowiada 13,84 mg / 0,17 ml (jedna dawka).

Zawartość etanolu w jednej dawce (0,17 ml) tego produktu jest równoważna mniej niż 0,4 ml piwa lub 0,2 ml wina. Niewielka ilość alkoholu w tym produkcie nie spowoduje żadnych zauważalnych skutków.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej dawce (0,17 ml), to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

PRZECHOWYWANIE

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Galeria



BÓL

**POTRÓJNE DZIAŁANIE
W WALCE Z BÓLEM GARDŁA**

INALDIN Gardlo, 1,5 mg/ml. Śluzki: 10ml (dla dzieci poniżej 17 lat) zawiera 250 mg ibuprofenu (substancja czynna). Preparat farmaceutyczny: wzrostki do stosowania w postaci tabletek, tabletki. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów bólu i zmniejszenie objawów stanów zapalnych: gorączki, grypy. Podmiot odpowiedzialny: Swiss Health Ireland Limited, 2011 Lake Drive, Clonsilla Business Campus, Dublin 24, D18PPT1, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



BÓL

**DZIAŁA ZNIECZULAJĄCO
ZWALCZA BÓL
LECZY STAN ZAPALNY**

INALDIN Gardlo, 1,5 mg/ml. Śluzki: 10ml (dla dzieci poniżej 17 lat) zawiera 250 mg ibuprofenu (substancja czynna). Preparat farmaceutyczny: wzrostki do stosowania w postaci tabletek, tabletki. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów bólu i zmniejszenie objawów stanów zapalnych: gorączki, grypy. Podmiot odpowiedzialny: Swiss Health Ireland Limited, 2011 Lake Drive, Clonsilla Business Campus, Dublin 24, D18PPT1, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

**DAWKOWANIE
I SPOSÓB PODAWANIA**



		
Dzieci poniżej 6 roku życia*	1 dawka na 4 kg masy ciała	2-6 razy na dobę
Dzieci od 6 do 12 lat**	4 dawki	2-6 razy na dobę
Dorośli i dzieci >12 roku życia**	4-8 dawek	2-6 razy na dobę

INALDIN Gardlo, 1,5 mg/ml. Śluzki: 10ml (dla dzieci poniżej 17 lat) zawiera 250 mg ibuprofenu (substancja czynna). Preparat farmaceutyczny: wzrostki do stosowania w postaci tabletek, tabletki. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów bólu i zmniejszenie objawów stanów zapalnych: gorączki, grypy. Podmiot odpowiedzialny: Swiss Health Ireland Limited, 2011 Lake Drive, Clonsilla Business Campus, Dublin 24, D18PPT1, Irlandia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.