

# Inaldin Gardło 3 mg, 20 tabletek do ssania

Nasza cena: 18,09 zł



## Opis słownikowy

Dawka	3 MG
Opakowanie	*20
Postać	TABL.D/SSANIA
Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED IRLANDIA [IE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	BENZYDAMINUM

## Opis produktu

### OPIS

INALDIN Gardło jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

### SKŁAD

Każda tabletkę do ssania zawiera 3 mg benzydaminę chlorowodoru (Benzydaminę hydrochloridum), co odpowiada 2,68 mg benzydaminę.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletkę do ssania zawiera 7 mg aspartamu (E 951).

Postać farmaceutyczna: Tabletkę do ssania. Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletkę barwy zielonej, o marmurkowej powierzchni i zapachu mięty, o średnicy około 13 mm.

### DAWKOWANIE

**Dorośli i osoby w podeszłym wieku:** 1 tabletkę do ssania 3 razy na dobę.

**Dzieci w wieku 6 lat i powyżej:** dawkowanie jak u osób dorosłych.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego INALDIN Gardło w postaci tabletek do ssania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Leczenie nie może przekraczać 7 dni.

#### Sposób podawania:

INALDIN Gardło jest przeznaczony do stosowania na śluzówkę jamy ustnej.

Tabletkę należy ssać. Nie należy ich rozgryzać ani połykać.

### PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu).

### DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE / SKUTKI UBOCZNE

#### Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). – reakcje anafilaktyczne, reakcje nadwrażliwości

## Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko (< 1/10 000) – skurcz krtani

## Zaburzenie żołądka i jelit

Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000) – pieczenie i suchość w jamie ustnej

## Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100) – nadwrażliwość na światło

Bardzo rzadko (< 1/10 000) – obrzęk naczynioruchowy

Wkrótce po przyjęciu leku może wystąpić uczucie drętwienia lub pieczenia w jamie ustnej lub gardle. Taka reakcja jest związana z normalnym działaniem leku i ustępuje po krótkim czasie. W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić nudności lub wymioty, które są wywołane przez odruch podrażnienia gardła, związany z przyjęciem leku. Objawy te ustępują samoistnie po przerwaniu przyjmowania leku.

## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA LEKU

U niewielu pacjentów może wystąpić owrzodzenie policzków lub gardła spowodowane przez ciężką chorobę. Dlatego pacjenci, u których objawy nasiliły się lub nie ustąpią w ciągu 3 dni, lub u których wystąpi gorączka albo inne objawy, muszą zasięgnąć odpowiedniej porady lekarza lub dentysty.

Długotrwałe stosowanie leku może wywoływać reakcje alergiczne. Jeśli to nastąpi, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego i skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniej terapii.

Nie zaleca się stosowania benzydaminu w przypadku nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową lub chorobami alergicznymi w wywiadzie, ponieważ u tych osób może wystąpić skurcz oskrzeli.

Ten produkt leczniczy zawiera 7 mg aspartamu w każdej tablecie do ssania. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Brak klinicznych i nieklinicznych danych dotyczących stosowania aspartamu u niemowląt w wieku poniżej 12 tygodni.

## PRZECHOWYWANIE

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**

## Galeria



**BÓL**

**POTRÓJNE DZIAŁANIE  
W WALCIE Z BÓLEM GARDŁA**

INALDIN GARDLO, 7 mg. Działania: znieczulające, przeciwzapalne, przeciwbólowe. Składniki: Ibuprofen, Ketoprofen, 240 mg benzylodany. Pochodzenie: Wieloletni doświadczenia. Wskazania do stosowania: INALDIN GARDLO, 7 mg. Pochodzenie: Wieloletni doświadczenia. Wskazania do stosowania: INALDIN GARDLO, 7 mg. Pochodzenie: Wieloletni doświadczenia. Wskazania do stosowania: INALDIN GARDLO, 7 mg.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



**BÓL**

**DZIAŁA ZNIECZULAJĄCO  
ZWALCZA BÓL  
LECZY STAN ZAPALNY**

INALDIN GARDLO, 7 mg. Działania: znieczulające, przeciwzapalne, przeciwbólowe. Składniki: Ibuprofen, Ketoprofen, 240 mg benzylodany. Pochodzenie: Wieloletni doświadczenia. Wskazania do stosowania: INALDIN GARDLO, 7 mg. Pochodzenie: Wieloletni doświadczenia. Wskazania do stosowania: INALDIN GARDLO, 7 mg. Pochodzenie: Wieloletni doświadczenia. Wskazania do stosowania: INALDIN GARDLO, 7 mg.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



**DAWKOWANIE  
I SPOSÓB PODAWANIA**

**inaldin  
GARDLO**

Dzieci w wieku 6 lat i powyżej	1 tabletkę	3 razy na dobę*
Dorośli	1 tabletkę	3 razy na dobę*

\*Lub więcej razy, nie należy przekroczyć 48 tabletek.

INALDIN GARDLO, 7 mg. Działania: znieczulające, przeciwzapalne, przeciwbólowe. Składniki: Ibuprofen, Ketoprofen, 240 mg benzylodany. Pochodzenie: Wieloletni doświadczenia. Wskazania do stosowania: INALDIN GARDLO, 7 mg. Pochodzenie: Wieloletni doświadczenia. Wskazania do stosowania: INALDIN GARDLO, 7 mg. Pochodzenie: Wieloletni doświadczenia. Wskazania do stosowania: INALDIN GARDLO, 7 mg.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.