

# Indapen 2,5 mg 20 tabletek

Nasza cena: 2,70 zł

## Opis słownikowy

Dawka	2,5MG
Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	POLPHARMA S.A. STAROGARD GDAŃSKI POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	INDAPAMIDUM

## Opis produktu

### Opis

## Wskazania - Indapen 2,5 mg 20 tabletek

Lek jest zalecany do stosowania podczas :

- samoistne nadciśnienie tętnicze
- do stosowania jako lek moczopędny

## Dawkowanie - Indapen 2,5 mg 20 tabletek

Lek stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dorośli. 1 tabletkę (2,5 mg)/dobę, rano. Działanie leku rozwija się stopniowo .jego pełne działanie może wystąpić dopiero po kilku miesiącach od rozpoczęcia leczenia. Zwiększanie dawek nie jest zalecane, nie nasili działania jedynie zwiększy działanie moczopędne. Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

## Działanie

Indapamid zawarty w produkcie stosowany jest jako lek moczopędny.

Stosowany w dawce 2,5 mg/dobę ,obniża ciśnienie tętnicze u pacjentów z nadciśnieniem. Prowadzi także do rozszerzenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia oporu naczyniowego.

## Skład

1 tabletkę zawiera 2,5 mg indapamidu

## Przeciwwskazania - Indapen 2,5 mg 20 tabletek

Nadwrażliwość na substancję czynną indapamid, inne sulfonamidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku.

Dodatkowo nie należy stosować produktu podczas gdy występuje :ciężka niewydolność nerek (bezmocz), encefalopatia wątrobowa , ciężkie zaburzenia czynności wątroby, hipokaliemia.

Nie należy przyjmować leku podczas karmienia piersią.

## Działania niepożądane

Podczas stosowania indapamidu mogą pojawić się działania niepożądane uzależnione od dawki przyjmowanego leku.

Często następuje zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia).  
Mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości (wysypka grudkowo-plamista).

Rzadko występują : ból głowy, zawroty,zaburzenia rytmu serca, uczucie zmęczenia,  
zaburzenia żołądka i jelit, obrzęk naczynio-ruchowy.  
Zgłaszano przypadki nadwrażliwości na światło.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.