

Insulina Fiasp 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie 5 wkładów po 3 ml

Nasza cena: 32,54 zł

Opis słownikowy

Dawka	100 J.M./ML
Opakowanie	5 WKŁ.A 3ML
Postać	ROZT.DO WSTRZ.
Producent	NOVO NORDISK A/S DANIA [DK]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	INSULINUM ASPARTUM

Opis produktu

Opis

Insulina Fiasp 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie 5 wkładów po 3 ml.

Skład ilościowy i jakościowy:

Fiasp 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie. Jeden wkład zawiera 300 jednostek insuliny aspart w 3 ml roztworu.

Wskazania:

Leczenie cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 1. roku życia.

Dawkowanie:

Produkt leczniczy Fiasp jest insuliną doposiłkową podawaną podskórną do 2 minut przed rozpoczęciem posiłku, z możliwością podania do 20 minut po rozpoczęciu posiłku.

Dawkowanie produktu leczniczego Fiasp jest dostosowywane indywidualnie i ustalone zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta. Produkt leczniczy Fiasp podawany we wstrzyknięciu podskórnym powinien być stosowany w skojarzeniu z preparatami insuliny o średnim lub długim czasie działania podawanymi przynajmniej raz na dobę. W schemacie leczenia baza-bolus około 50% zapotrzebowania może być pokryte za pomocą produktu leczniczego Fiasp, a reszta za pomocą preparatów insuliny o średnim lub długim czasie działania. Całkowite dobowe indywidualne zapotrzebowanie na insulinę u dorosłych, młodzieży i dzieci może się różnić i zazwyczaj wynosi od 0,5 do 1,0 jednostki/kg/ dobę. Dla osiągnięcia optymalnej kontroli glikemii zalecane jest monitorowanie stężenia glukozy we krwi oraz dostosowywanie dawki insuliny. Dostosowanie dawki produktu leczniczego może być konieczne w przypadku, gdy pacjenci zwiększają aktywność fizyczną, zmieniają dotychczas stosowaną dietę lub podczas równocześnie występujących chorób. Stężenie glukozy we krwi

powinno być monitorowane odpowiednio do tych okoliczności. Czas działania może różnić się w zależności od dawki, miejsca wstrzyknięcia, przepływu krwi, temperatury oraz poziomu aktywności fizycznej. Pacjenci leczeni zgodnie ze schematem baza-bolus, którzy zapomnieli oprzyjęciu do posiłkowej dawki insuliny, powinni sprawdzić stężenie glukozy we krwi, aby podjąć decyzję, czy potrzebne jest podanie insuliny. Pacjenci powinni powrócić do zwykłego schematu dawkowania podczas następnego posiłku. Siła działania analogów insuliny, w tym produktu leczniczego Fiasp, wyrażana jest w jednostkach(j.).

Jedna (1) jednostka produktu leczniczego Fiasp odpowiada 1 jednostce międzynarodowej insuliny ludzkiej lub 1 jednostce innego szybko działającego analogu insuliny. Podczas zalecania produktu leczniczego Fiasp należy wziąć pod uwagę jego szybki początek działania.

Szczegóły znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.