

## Intesta Max, 30 saszetek



Nasza cena: 40,93 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	*30 sasz.
Producent	BIOLEK SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Typ Produktu	Suplement diety

### Opis produktu

#### Opis

### Intesta Max, 30 saszetek

Intesta Max to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci granulatu. Produkt przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w chorobach i zaburzeniach funkcjonowania jelit, takich jak:

- zespół jelita nadwrażliwego (IBS)
- biegunki i zaburzenia jelitowe wywołane między innymi antybiotykoterapią, radioterapią, chemioterapią lub patogenami
- zaburzenia spowodowane zabiegami chirurgicznymi w obrębie jelit
- choroby zapalne jelit
- choroba uchyłkowa jelit

Substancją aktywną w produkcie jest maślan sodu w specjalnie opracowanej matrycy trójglicerydowej, która chroni składnik odżywczy przed wchłonięciem w żołądku i pomaga w dostarczeniu go do jelita grubego. Matrycę stanowią odpowiednio dobrane, całkowicie uwodornione trójglicerydy kwasów tłuszczowych z oleju palmowego (technologia mikrootoczkowania MSB, ang. Microencapsulated sodium butyrate). Granulat w saszetce jest nierozpuszczalny w wodzie i posiada dodatek naturalnego aromatu żurawinowego.

#### Wskazania:

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego:

- w zaburzeniach czynności jelit
- w chorobach zapalnych błony śluzowej jelit
- w zaburzeniach flory jelitowej
- w zakażeniach jelit i bieguncie.

## Zalecane spożycie:

Dorośli: 1 saszetka dziennie, rano po śniadaniu.

Granulat z saszetki zaleca się wsypać bezpośrednio do ust i popić wodą o temperaturze pokojowej lub zmieszać z gęstym posiłkiem, np. jogurtem lub serkiem i spożyć bezpośrednio po otwarciu saszetki.

## Sposób użycia:

Zespół jelita nadwrażliwego (IBS) i inne zaburzenia czynnościowe jelit:

- zaleca się przyjmować 1 saszetkę rano po śniadaniu do momentu uzyskania pozytywnego efektu dietetycznego, nie krócej niż jeden miesiąc,
- jeśli w tym okresie nie zostanie uzyskany pozytywny efekt dietetyczny, postępowanie z użyciem preparatu Intesta Max można kontynuować aż do jego osiągnięcia,
- dalsze postępowanie, w celu utrzymania osiągniętego efektu dietetycznego, można kontynuować z użyciem preparatu Intesta w kapsułkach, który zawiera mniejszą porcję maślanu sodu.

Biegunki i zaburzenia jelitowe wywołane między innymi przez antybiotykoterapię, radioterapię, chemioterapię lub patogeny:

- zaleca się przyjmować 1 saszetkę rano po śniadaniu do momentu uzyskania pozytywnego efektu dietetycznego, nie krócej niż jeden miesiąc,
- jeśli w tym okresie nie zostanie uzyskany pozytywny efekt dietetyczny, postępowanie z użyciem preparatu Intesta Max można kontynuować aż do jego osiągnięcia,
- dalsze postępowanie, w celu utrzymania osiągniętego efektu dietetycznego, można kontynuować z użyciem preparatu Intesta w kapsułkach, który zawiera mniejszą porcję maślanu sodu.

Stosowanie przed i po zabiegu chirurgicznym w obrębie jelit:

- zaleca się przyjmować 1 saszetkę rano po śniadaniu lub 1 saszetkę rano po śniadaniu i 1 saszetkę wieczorem po kolacji, przez około 10-14 dni przed operacją,
- zaleca się przyjmować 1 saszetkę rano po śniadaniu lub 1 saszetkę rano po śniadaniu i 1 saszetkę wieczorem po kolacji, przez około 2 tygodnie po operacji.

Nieswoiste choroby zapalne jelit oraz choroba uchyłkowa jelit:

- zaleca się przyjmować 1 saszetkę rano po śniadaniu.

## Składniki:

Mieszanina całkowicie uwodornionych trójglicerydów kwasów tłuszczowych z oleju palmowego, maślan sodu, aromat naturalny żurawinowy, substancja słodząca: acesulfam K.

100 g produktu zawiera: wartość energetyczna 2836 kJ/ 688 kcal, tłuszcz 70 g, w tym kwasy tłuszczowe 70 g; węglowodany 14 g, w tym cukry 0 g; białko 0,5 g, sól 16,2 g, w tym sól 6,5 g, maślan sodu 30 g.