

# Inuprin Forte, 30 tabletek



Nasza cena: 32,67 zł

## Opis słownikowy

Dawka	1 G
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	SOLINEA SP. Z O.O. SP.K. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	INOSINUM

## Opis produktu

### Opis

## Inuprin Forte, 30 tabletek

Lek Inuprin Forte zawiera jako substancję czynną inozyny pranobeks, która wykazuje działanie przeciwwirusowe i pobudzające czynność układu odpornościowego.

## Wskazania

- Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
- W leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Lek może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

## Przeciwwskazania

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

- nagle pojawiający się świszczący oddech,
- trudności z oddychaniem,
- obrzęk powiek, twarzy lub warg,
- wysypka lub świąd (zwłaszcza, jeżeli dotyczą całego ciała).

Leku Inuprin Forte nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 1 roku życia.

## Dawkowanie

Dorośli: 50 mg/kg masy ciała na dobę w kilku równych dawkach podzielonych; zwykle 1 g (1 tabletką) 3 razy na dobę. Dawka

maksymalna wynosi 4 g na dobę (czyli 1 tabletka 4 razy na dobę).

Dzieci po ukończeniu 1. roku życia: 50 mg/kg masy ciała na dobę w 3–4 dawkach podzielonych. Dla dzieci, które nie potrafią połykać tabletek, zalecany jest preparat w postaci syropu.

### Sposób przyjmowania:

Tabletki należy popić dużą ilością płynu, najlepiej wody. Tabletkę można pokruszyć i rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

### Czas trwania leczenia:

Leczenie trwa zwykle 5–14 dni; lek należy stosować jeszcze przez 1–2 dni po ustąpieniu objawów.

Jeżeli po upływie 5–14 dni nie nastąpi poprawa, należy skonsultować się z lekarzem.

## Czy można stosować Inuprin Forte - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

Preparatu nie należy stosować w ciąży ani w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za konieczne i je zaleci.

## Możliwe działania nieporządane

Najczęściej występuje zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i w moczu, normalizujące się w kilka dni po zaprzestaniu stosowania preparatu. Często możliwe: nudności, wymioty, dyskomfort w nadbrzuszu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, bóle i zawroty głowy, zmęczenie, złe samopoczucie, bóle stawów, świąd, wysypka. Niezbyt często możliwe: biegunka, zaparcia, nerwowość, senność, bezsenność, zwiększona objętość moczu.

Z nieznaną częstością możliwe: zawroty głowy, ból w nadbrzuszu, zaczerwienienie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła i krtani, który może utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia), reakcje anafilaktyczne, które mogą mieć ciężki przebieg i mogą stanowić zagrożenie życia. Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek objawy reakcji alergicznej (np. wysypka, świąd, obrzęk ust, języka lub krtani, trudności w oddychaniu), należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

## Skład

Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (kompleks zawierający inozynę oraz 4-acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3), celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, poliwinylpiperolidon K90, magnezu stearynian.

Jedna tabletka zawiera 1000 mg inozyny pranobeksu.

## Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze 2-25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## Podmiot odpowiedzialny

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**