

InVag 7 kapsułek dopochwowych

Nasza cena: 39,97 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|---|
| Opakowanie | *7 |
| Postać | Kapsułki dopochwowe |
| Producent | BIOMED-KRAKÓW WYTW.SUR.I SZCZEP. POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Lek bez recepty |

Opis produktu

Opis

INVAG® kapsułki dopochwowe

Produkt leczniczy dostępny bez recepty (OTC)

POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: nr 18689, wydane przez Prezesa URPL

Opis i zastosowanie:

INVAG® kapsułki dopochwowe przeznaczone dla kobiet w celu przywrócenia lub uzupełnienia flory bakteryjnej i utrzymania właściwego pH pochwy.

Lek zaleca się stosować:

- w zapobieganiu infekcjom układu moczowo-płciowego (w trakcie i po systemowych kuracjach antybiotykami i innymi lekami przeciwdrobnoustrojowymi oraz w okresie klimakterium i po porożu),
 - profilaktycznie we wszelkich sytuacjach, w których dochodzi do zaburzenia równowagi flory pochwy (np. niewłaściwe przyzwyczajenia higieniczne, antykoncepcja),
 - wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych pochwy (zakażenia pochwy), w trakcie i po leczeniu antybiotykami, innymi lekami przeciwdrobnoustrojowymi (także podczas leczenia upławów).
- Lek przeznaczony dla kobiet.

Dawkowanie:

1 kapsułka na noc przez 1 tydzień.

W razie potrzeby leczenie należy powtórzyć, po skonsultowaniu się z lekarzem.

Sposób stosowania:

kapsułkę należy umieścić głęboko w pochwie zachowując zasady higieny osobistej.

Przeciwwskazania:

uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:

należy zachować szczególną ostrożność u pacjentek z ciężkim zaburzeniem układu immunologicznego.

Działania niepożądane:

W wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu klinicznym, kontrolowanym placebo, z udziałem dorosłych kobiet, nie obserwowano ciężkich działań niepożądanych po stosowaniu INVAG®. Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w częstości występowania zdarzeń niepożądanych pomiędzy grupą stosującą INVAG® a grupą stosującą placebo. W obu grupach stwierdzono zdarzenia niepożądane o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, ale związek z zastosowaniem produktu najczęściej oceniano jako mało prawdopodobny lub prawdopodobny. Działania występujące często (1/100 do <1/10): upławy, świąd, pieczenie, ból w podbrzuszu, plamienie, obrzęk i zaczerwienienie warg sromowych, erytroplakia, częstomocz, parcie na mocz, przeziębienie, ból głowy.

Przechowywanie:

Lodówka (2-8°C).

Dostępne opakowania:

7 kaps, 14 kaps

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.