

Invirum 200 mg, 30 tabletek

Nasza cena: 15,48 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,2 G
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	Aflopa - Pabianice
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Leczenie nawrotowej opryszczki: warg i twarzy wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych; zewnętrznych narządów płciowych wywołanej przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u dorosłych. Invirum może być stosowany jedynie u pacjentów, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej.

Dawkowanie:

Dorośli: 200mg pięć razy na dobę, co 4 godziny (z przerwą nocną), przez 5 dni.

W zakażeniach nawracających szczególnie ważne jest rozpoczęcie leczenia w okresie prodromalnym (objawów zwiastunowych - np. pieczenie, świąd) lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min): decyzję o sposobie dawkowania podejmuje tylko lekarz, który może zmniejszyć dawkę do 1 tabletki (200mg) 2 razy na dobę, co ok. 12 godzin.

Pacjenci w podeszłym wieku: należy wziąć pod uwagę możliwość zaburzenia czynności nerek. W czasie leczenia należy przyjmować dużo płynów. Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat
- Nie przyjmować w przypadku nadwrażliwości na acyklowir, walacyklowir lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą
- Nie stosować Invirum bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem: u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek; u pacjentów z niewydolnością nerek, zwłaszcza odwodnionych, którzy stosują duże dawki acyklowiru lub inne leki mogące uszkodzić nerki; u pacjentów w podeszłym wieku; u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią; u osób z obniżoną odpornością (np. po przeszczepie szpiku kostnego, zakażone wirusem HIV).

Składniki:

1 tabletkę zawiera: substancję czynną: 200mg acyklowiru (Aciclovirum); substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, powidon K30, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, magnezu stearynian.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.