

IPP 20 tabletki dojelitowe 56 sztuk 20 mg

Nasza cena: 19,84 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,02 G
Opakowanie	*56
Postać	TABL.DOJELIT.
Producent	SANDOZ GMBH AUSTRIA [AT]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	PANTOPRAZOLUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

- objawowe leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego.
- długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku.
- zapobieganie powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy

Dawkowanie:

Objawowe leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego:

- Zalecana dawka to jedna tabletkę na dobę. Ustąpienie objawów powinno ustąpić po okresie ok. 2 - 4 tygodni.

Zapobieganie powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy:

- Zalecana dawka doustna to jedna tabletkę na dobę.

Zaburzenia czynności wątroby:

- Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg pantoprazolu na dobę.

W celu ustalenia szczegółowej dawki leku należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania bądź też skonsultować się z lekarzem lub też farmaceutą.

Działanie:

Pantoprazol jest podstawionym benzoimidazolem, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku poprzez specyficzne blokowanie pompy protonowej w komórkach okładzinowych. W kwaśnym środowisku komórek okładzinowych, pantoprazol przekształcany jest do postaci czynnej i hamuje aktywność H⁺,K⁺-ATP-azy, czyli końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Stopień zahamowania wydzielania kwasu solnego jest zależny od dawki i dotyczy zarówno podstawowego, jak i stymulowanego wydzielania kwasu solnego. U większości pacjentów ustąpienie objawów osiągnięte jest w ciągu 2 tyg. Tak jak w przypadku innych inhibitorów pompy protonowej oraz antagonistów receptorów histaminowych H₂, leczenie pantoprazolem prowadzi do zmniejszenia kwaśności treści żołądkowej oraz wtórnego zwiększenia wydzielania gastryny w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwaśności. Wydzielanie gastryny jest odwracalne. Ponieważ pantoprazol wiąże się z pompą protonową na poziomie receptora komórkowego, może on wpływać na wydzielanie kwasu solnego niezależnie od stymulacji przez inne substancje (acetylocholina, histamina, gastryna). Skutek jest taki sam niezależnie od tego, czy produkt jest podawany doustnie czy dożylnie.

Skład:

1 tabletkę dojelitową zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeżeli występuje u pacjenta nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:

- biegunka,
- ból głowy,
- nadwrażliwość,
- hipokaliemia,
- zaburzenia snu,
- depresja,
- dezorientacja,
- omamy,
- splątanie,
- zawroty głowy,
- zaburzenia smaku,
- uszkodzenia miększu wątroby,
- żółtaczka,
- niewydolność wątroby,
- wysypka skórna/wyprysk/wykwity skórne,
- świąd,
- pokrzywka,

- obrzęk naczynioruchowy.

W celu zapoznania się z innymi działaniami niepożądanymi należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.