

Ismigen 30 tabletek pod język

Nasza cena: 122,04 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*30
Postać	TABL.PODJ.
Producent	LALLEMAND PHARMA DANIA [DK]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	PRODUCTUM COMPOSITUM

Opis produktu

Opis

Co to jest lek Ismigen?

Ismigen to szczepionka doustna zawierająca lizaty bakterii odpowiedzialne za wywoływanie zakażeń w drogach oddechowych. Lek wykorzystuje się do budowania odporności zarówno u dzieci jaki i u dorosłych.

Wskazania do stosowania

Lek ISMIGEN jest wskazany do stosowania u następujących grup wiekowych:

Dorośli:

- Profilaktyka nawracających zakażeń dróg oddechowych (ZDO) u dorosłych.

Dzieci

- Profilaktyka nawracających zakażeń dróg oddechowych (ZDO) u dzieci w wieku od 3 lat.

Skład

Skład przedstawiono w tabeli

Każda tabletką Ismigenu zawiera 7 mg lizatu bakterii:	Staphylococcus aureus 6 miliardów Streptococcus pyogenes 6 miliardów Streptococcus (viridans) oralis 6 miliardów Klebsiella pneumoniae 6 miliardów Klebsiella ozaenae 6 miliardów Haemophilus influenzae 6 miliardów
---	---

	Neisseria catarrhalis 6 miliardów Streptococcus pneumoniae 6 miliardów (w tym typ TY1 - 1 miliard, typ TY2 - 1 miliard, typ TY3 - 1 miliard, typ TY5 - 1 miliard, typ TY8 - 1 miliard, typ TY47 - 1 miliard) oraz 43 mg glicyny.
Substancje pomocnicze:	celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, krzemionka koloidalna uwodniona, magnezu stearynian, amonowy glicyryzynian, wyciąg ze sproszkowanej mięty.
Dostępne opakowania:	3 blistry po 10 tabletek podjęzykowych, w tekturowym pudełku.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Ismigen jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania leku ISMIGEN w celu zapobiegania zapaleniu płuc, ponieważ nie istnieją żadne dane pochodzące z badań klinicznych potwierdzające takie działanie.

Interakcje z innymi lekami

Nie stwierdzono żadnych interakcji Ismigenu z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Dawkowanie leku Ismigen

Zalecana dawka to:

Dorośli

Jedna tabletkę dziennie przed jedzeniem, rozpuścić pod językiem. Stosować przez dziesięć kolejnych dni w miesiącu, przez okres 3 miesięcy.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 3 lat i powyżej)

Jedna tabletkę dziennie przed jedzeniem, rozpuścić pod językiem. Stosować przez dziesięć kolejnych dni w miesiącu, przez okres 3 miesięcy.

Sposób podawania leku Ismigen

Podjęzykowo: rozpuścić pod językiem.

Linia podziału na tabletkę tylko ułatwia jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku ISMIGEN

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku ISMIGEN, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku ISMIGEN

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku ISMIGEN

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Ismigen a koronawirus

Ismigen nie jest lekiem skierowanym przeciwko koronawirusowi, ani przeciwko innym wirusom. Ismigen stosowany jest w profilaktyce nawracających zakażeń dróg oddechowych wywoływanych przez bakterie a nie wirusy.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu szczepionki do obrotu (częstość nieznana): ból gardła, reakcje nadwrażliwości typu alergicznego obejmujące pokrzywkę, wysypkę, świąd i obrzęk, gorączka i ból głowy, wymioty i ból brzucha.

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Deklarowany termin ważności dotyczy wyłącznie produktu w nienaruszonym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

LALLEMAND Pharma Europe Bredstrupvej 33
8500 Grenaa Dania

Wytwórca:
Bruschettini S.r.l.
Via Isonzo 6
16147 Genua Włochy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.