

Jonolit baby, 10 saszetek

Nasza cena: 13,28 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*10
Postać	Saszetki
Producent	OLEOFARM POLSKA [PL]

Opis produktu

Opis

Jonolit baby, 10 saszetek

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

10 saszetek

Do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, w trakcie biegunki i/lub wymiotów.

Dla niemowląt od 1. dnia życia oraz dzieci do 3. roku życia.

Jonolit baby jest preparatem w postaci proszku do przygotowania doustnego płynu nawadniającego o zmniejszonej osmolarności i zawartości sodu, którego skład zgodny jest z zaleceniami ESPGHAN. W stanach odwodnienia organizmu, niezależnie od ich przyczyny, zaburzeniom ulega równowaga wodno-elektrolitowa. Konieczne jest wtedy uzupełnianie diety w glukozę i minerały podane w odpowiednich proporcjach.

Składniki

glukoza, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu.

Wartość odżywcza	100 g produktu w saszetkach	200 ml produktu
wartość energetyczna	1064 kJ / 304 kcal	
tłuszcz, w tym:	0 g	
kwasy tłuszczowe nasycone	0 g	

węglowodany, w tym:	76 g
cukry	73 g
białko	0 g
sól, z czego	14 g
sód	6273 mg

200ml płynu przygotowanego zgodnie z instrukcją zawiera: 3,24 g glukozy, 379 mg cytrynianu, 355 mg chlorków, 276 mg sodu, 157 mg potasu. Osmolarność roztworu: 230 mOsm/l/

Masa netto

44g (10 saszetek po 4,4 g)

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu uzależnione jest od stopnia odwodnienia organizmu, etapu nawadniania oraz zaleceń lekarskich. Zgodnie z zaleceniami WHO/UNICEF:

Masa ciała/ wiek	Faza nawadniania (pierw
Masa ciała poniżej 5 kg (wiek poniżej 4 miesięcy)	zawartość 1 – 2 saszetek rozpuścić saszetka na 200 ml wody
Masa ciała 5 – 7,9 kg (wiek 4 – 11 miesięcy)	zawartość 2 – 3 saszetek rozpuścić saszetka na 200 ml wody
Masa ciała 8 – 10,9 kg (wiek 12 – 23 miesięcy)	zawartość 3 – 4 saszetek rozpuścić saszetka na 200 ml wody
Masa ciała 11-15,9 kg (wiek: 2-3 lata)	zawartość 4 – 6 saszetek rozpuścić 1 saszetka na 200 ml wod

Sposób użycia

Saszetkę należy otworzyć, a następnie jej zawartość rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody. Przed podaniem schłodzić. Roztwór powinien być podawany niemowlętom oraz dzieciom za pomocą czystej łyżeczki lub kubeczka. Niemowlętom oraz dzieciom do 2. roku życia wlewać roztwór małymi porcjami bezpośrednio do ust co 1-2 minut, starsze dzieci mogą popijać małymi łykami bezpośrednio z kubeczka. W przypadku wystąpienia wymiotów u dziecka, nawadnianie należy przerwać na 5–10 minut, a następnie rozpocząć podawanie płynu w wolniejszym tempie. Sporządzonego roztworu nie należy dosładzać. Płyn należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Roztwór nie nadaje się do spożycia po upływie 24 godzin po przygotowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Przeciwwskazania

wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ważna informacja

Produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem. Preparat może stanowić zagrożenie gdy przyjmowany jest w przypadku braku wskazań lekarskich wynikających z przeznaczenia produktu. Produkt jest żywnością niekompletną. Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Produkt przeznaczony jest dla niemowląt od 1. dnia życia oraz dzieci do 3. roku życia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent

Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław