Serwis Internetowy Świat Leku
Górnicza 2, Łęczyca
+48 24 721 05 34

Kaldyum 315 mg 100 kapsułek

Nasza cena: 43,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*100
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	KALII CHLORIDUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Lek może być stosowany jako profilaktyka i leczenie następstw stanów niedoboru potasu w organizmie spowodowanych stanami chorobowymi:

- wymioty,

- biegunka,

- nadczynność nadnerczy,

- zwiększona utrata potasu przez nerki,

- leczenie lekami moczopędnymi i kortykosteroidami

Dawkowanie:

Lek ten należy stosować indywidualnie w zależności od potrzeb pacjenta, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego,

- W zapobieganiu niedoboru potasu zaleca się stosowanie 2 – 3 kapsułek dziennie co odpowiada 16-24 mmol K+,

- W leczeniu hipokalemii zaleca się stosowanie 5 – 12 kapsułek dziennie co odpowiada 40-96 mmol K+,

Produkt ten powinien być stosowany w ciągu doby w równych podzielonych dawkach.

Działanie:

Zawarte w produkcie peletki zapewniające optymalne uwalnianie potasu

Natomiast zawarty w produkcie potas:

- powoduje zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych (działa antagonistycznie w stosunku do wapnia),

- przeciwdziała pęcznieniu komórek,

- jego obecność jest niezbędna do syntezy białek w rybosomach,

- jest niezbędnym elementem wielu procesów enzymatycznych,

- warunkuje prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni,

- razem z sodem i chlorkami stanowi najważniejszą część składową płynów pozakomórkowych,

- ma wpływ na gospodarkę wodną, kwasowo-zasadową organizmu,

- bierze udział w utrzymaniu ciśnienia osmotycznego,

- odgrywa ważną rolę w przemianie węglowodanów.

Skład:

1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 600 mg chlorku potasu (315 mg potasu). Substancja aktywna jest wbudowana w peletki zapewniające stałe uwalnianie leku po dezintegracji kapsułki.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeżeli u pacjentów wystepuje którakolwiek z poniższych dolegliwości:

- hiperkalemia,

- skąpomocz,

- bezmocz i mocznica w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek,

- mocznica w przewlekłej niewydolności nerek,

- nie leczona choroba Addisona,

- ostre odwodnienie,

- niedrożność przewodu pokarmowego

- zwężenie przełyku utrudniające przełykanie.

Działania niepożądane:

Najczęściej pojawiające się działania niepożądane podczas stosowania leku to:

- nudności,

- wymioty,

- biegunka,

- bóle brzucha,

- krwawienia z przewodu pokarmowego,

- owrzodzenia,

- perforacji,

- niedrożności przewodu pokarmowego.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.