

Katelin+ SR, kapsułki, 100 sztuk

Nasza cena: 25,51 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*100
Postać	kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
Producent	LEK-AM Zakroczym
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	KALII CHLORIDUM

Opis produktu

OPIS

Katelin+ SR to suplement diety w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu zawierający mikropeletki uwalniające w przedłużony sposób (SR) chlorek potasu.

Preparat przeznaczony dla osób dorosłych do stosowania w celu uzupełniania normalnej diety w potas.

Bez laktozy

Bez glutenu

SKŁADNIKI

chlorek potasu (potas); żelatyna; substancja wypełniająca - celuloza mikrokryształiczna; skrobia kukurydziana; substancja glazurująca - etyloceluloza; substancja zagęszczająca - hydroksypropylometyloceluloza; barwniki - błękit brylantowy FCF, koszenila.

Składnik	2 kapsułki (%RWS*)	3 kapsułki (%RWS*)
Potas	630 mg (3,15%)	945 mg (4,725%)

*%RWS - referencyjna wartość spożycia

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW

Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego oraz mięśni.

MASA NETTO

90 g

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE

Dorośli: 2-3 kapsułki dziennie. Kapsułki należy obficie popić wodą. W przypadku osób mających problem z połknięciem: kapsułkę należy otworzyć i wysypać jej zawartość do spożywanego pokarmu bezpośrednio przed spożyciem. Niezwłocznie popić wodą.

OSTRZEŻENIA

Nie zaleca się stosowania preparatu **kobietom w ciąży i karmiącym piersią**.
Należy brać pod uwagę ilość przyjmowanego potasu z innych źródeł.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w suchym miejscu. Chronić przed światłem.

PRODUCENT / DYSTRYBUTOR

LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowińska 14A
05-170 Zakroczym

Wytwórca:

For-med Sp. z o.o.
ul. Osowska 85/2
04-351 Warszawa

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.