

Kidofen Max 100 ml



Nasza cena: 25,11 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Dawka | 0,25 G/5ML |
| Opakowanie | 100 ml |
| Postać | ZAW.DOUST. |
| Producent | AFLOPA - PABIANICE POLSKA |
| Rejestracja | Lek bez recepty |
| Substancja czynna | IBUPROFENUM |

Opis produktu

Opis

Kidofen Max 100 ml zawiesina doustna

Lek o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym przeznaczony dla dzieci już od 3-go miesiąca życia.

Dzięki najwyższej dostępnej dawce ibuprofenu możliwe jest podanie mniejszej ilości leku.

Substancja czynna

Ibuprofenum 250 mg/5 ml

Wskazania

- Gorączka różnego pochodzenia: również ta występująca w przebiegu zakażeń wirusowych, czy w przebiegu odczynu poszczepiennego;
- Ból różnego pochodzenia o nasileniu od słabego do umiarkowanego;
 - bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych;
 - bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządów ruchu np. nadwyrężenia, skręcenia;
 - bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne;
 - bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania;
 - bóle głowy;
 - bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Dawkowanie

Niemowlęta 3-6 miesięcy (5-7,6 kg): 3 razy po 2,5 ml na dobę.
Niemowlęta 6-12 miesięcy (7,7-9 kg): 3 do 4 razy po 2,5 ml na dobę.
Dzieci 1-3 lata (10-15 kg): 3 razy po 5 ml na dobę.
Dzieci 4-6 lat (16-20 kg): 3 razy po 7,5 ml na dobę.
Dzieci 7-9 lat (21-29 kg): 3 razy po 10 ml na dobę.
Dzieci 10-12 lat (30-40 kg): 3 razy po 15 ml na dobę.

Przeciwwskazania

Nie należy przyjmować leku Kidofen Max w sytuacji występowania u pacjenta:

- uczulenia na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe lub na którykolwiek składnik preparatu;
- duszności, pokrzywki, astmy, kataru, obrzęku twarzy i/lub dłoni po zażyciu kwasu salicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych;
- choroby wrzodowej żołądka, dwunastnicy lub krwawienia z przewodu pokarmowego;
- krwawienia lub perforacji przewodu pokarmowego po zażyciu leków z grupy NLPZ;
- ciężkiej niewydolności wątroby i nerek;
- ciężkiej niewydolności serca;
- czynnego krwawienia w mózgu lub jakiegokolwiek innego;
- zaburzeń krzepnięcia krwi;
- zaburzeń wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu;
- ciężkiego odwodnienia;

Nie należy przyjmować leku w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Informacja dla pacjenta

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o. o.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.