


Klarin, tabletki, 60 szt.



Nasza cena: 20,17 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*60
Postać	Tabletki
Producent	FARMAPOL-POZNAN POLSKA [PL]
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	VACCINIUM MYRTILLUS

Opis produktu

Opis

Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych jako uzupełnienie codziennej diety w antocyjany z borówki czernicy, beta-karoten i witaminę E. Preparat nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę

Skład:

Sproszkowany owoc borówki czernicy, dwutlenek krzemu (substancja przeciw-zbrylająca), skrobia ziemniaczana (substancja wypełniająca), octan DL-alfa-tokoferylu, poliwinylpirlidon (nośnik), beta-karoten, stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca).

Dzienna dawka:

Sproszkowany owoc borówki czernicy	600 mg	
Witamina E	12 mg ekwiwalentu alfatokoferolu	100% RDA*
Beta-karoten (prowitamina A)	1 mg (167 mcg ekwiwalentu retinolu)	20,9% RDA*

* % RDA - procent zalecanego dziennego spożycia

Działanie:

Borówka czernica wchodząca w skład suplementu diety Klarin:

- pomaga chronić oczy,
- jest źródłem antyoksydantów, które wspierają oczy i pomagają utrzymać właściwe funkcje siatkówki oka,
- stanowi naturalną ochronę przeciwko wolnym rodnikom,
- wspiera klarowność widzenia,
- utrzymuje oczy w zdrowiu,
- wspiera przepływ krwi do oka.

Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Dawkowanie:

1 tabletkę 2 razy dziennie.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Uwagi:

- Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Chronić od wilgoci i światła.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.