

# KLINDACIN T 30 G 1%

Nasza cena: 23,71 zł

## Opis słownikowy

Dawka	1%
Opakowanie	30 g
Postać	ZEL
Producent	POLFA TARCHOMIN S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	CLINDAMYCINUM

## Opis produktu

### Opis

### Skład:

1 g żelu zawiera 10 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci klindamycyny fosforanu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glikol propylenowy 50 mg/g.

### Wskazania do stosowania:

Miejscowe leczenie trądziku pospolitego.

### Dawkowanie i sposób podawania:

Klindacin T przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

### Dawkowanie:

#### Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

Żel nanosi się cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę dwa razy na dobę - rano i wieczorem.

Przeciętny okres leczenia wynosi około 4 – 8 tygodni.

#### Dzieci poniżej 12 lat:

Bezpieczeństwo stosowania produktu Klindacin T u dzieci poniżej 12 lat nie zostało określone. Sposób podawania

Żel należy nakładać na oczyszczoną suchą skórę.

Po nałożeniu preparatu należy dokładnie umyć ręce.

### **Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwości na klindamycynę, linkomycynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

### **Działania niepożądane:**

#### **Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:**

- częstość nieznana: zapalenie mieszków włosowych

#### **Zaburzenia żołądka i jelit:**

- częstość nieznana: ból brzucha, wzdęcia, biegunki

#### **Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:**

- częstość nieznana: pieczenie, świąd, rumień, nadmierne wysuszenie lub przetłuszczanie się skóry, kontaktowe alergiczne zapalenie skóry.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.