

Koenzym Q10 Forte, 60 kapsułek

Nasza cena: 39,28 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*60
Postać	KAPS.
Producent	Hasco-Lek, Wrocław
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Właściwości i zastosowanie:

Koenzym Q10 znajduje się we wszystkich komórkach organizmu, zwłaszcza w komórkach mięśnia sercowego i mięśni szkieletowych.

Lek Koenzym Q10 Forte stosuje się jako uzupełnienie diety w koenzym Q10, szczególnie:

- osób starszych, u których wraz z wiekiem dochodzi do fizjologicznego obniżenia zawartości koenzymu Q10 we krwi i tkankach
- osób stosujących mało zróżnicowaną dietę, ubogą w mięso i ryby
- osób uprawiających intensywny wysiłek fizyczny
- profilaktyce miażdżycy
- paradontopatiach

Sposób użycia:

1 - 3 kapsułek dziennie (w 3 dawkach podzielonych). Stosować po posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu żywienia.

W paradontopatiach: 1 kapsułka na dobę

Skład:

W leku Koenzym Q10 Forte substancją czynną jest ubidekarenon. W jednej kapsułce leku znajduje się 100 mg ubidekarenonu.

Substancje pomocnicze: trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, otoczka kapsułki: żelatyna wieprzowa 200 bloom, glicerol, sorbitol ciekły niekryształizujący, tytanu dwutlenek (E 171), czerwień koszulinowa (E 124).

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, również Koenzym Q10 Forte może powodować działania niepożądane, chociaż trzeba mieć świadomość, że nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1000)

-dyskomfort w nadbrzuszu

-utrata apetytu

-nudności

-biegunka

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów)

-zaczerwienienia skóry

-reakcje uczulenia

Jeśli wystąpią jakieś objawy niepożądane należy skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.