

## Kopiryna, 0,4g+0,05g, 6 tabletek



Nasza cena: 2,40 zł

### Opis słownikowy

Dawka	0,4G+0,05G
Opakowanie	*6
Postać	Tabletki
Producent	MEDICOFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM, COFFEINUM

### Opis produktu

#### Opis

### Kopiryna, 0,4g+0,05g, 6 tabletek

Preparat zalecany szczególnie przy bólach głowy, bólach mięśni, bólach miesiączkowych, a także w gorączce.

#### Dawkowanie

Dorośli 1-2 tabletki do 3 razy na dobę. Dzieci powyżej 12 lat: 1/2-1tabletki 3 razy na dobę. Tabletki należy popijać dużą ilością wody.

#### Skład

Kwas acetylosalicylowy 400 mg, kofeina 50 mg, substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana.

#### Działanie

Kopiryna to lek przeciwbólowy o wysokiej skuteczności działania. Preparat zawiera dwie substancje czynne: kwas acetylosalicylowy u działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Uważa się, że kofeina wspomaga działanie kwasu acetylosalicylowego przy bólach głowy.

#### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, ciąża i karmienie piersią, krwawienie z przewodu pokarmowego. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

#### Możliwe działania nieporządane

Bóle żołądka, brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie i krwawienia z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, perforacje, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, przemijające zaburzenia czynności wątroby, ból głowy, zawroty i szumy uszne, wylew krwi do mózgu, po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego odnotowano uszkodzenie nerek, reakcje uczuleniowe, bezsenność, niepokój, kołatanie serca, przyspieszenie rytmu serca.

## Uwagi

Nie należy stosować z: metotreksatem, pochodnymi kumaryny, heparyny, tyklopidyny, glikokortykosteroidami z wyjątkiem hydrokortyzonu, digoksyną, lekami stosowanymi w cukrzycy, kwasem walproinowym, sympatykomimetykami, tyroksyną, substancjami zbliżonymi do efedryny, z pochodnymi kwasu barbiturowego.

O tym co powoduje ból głowy i jakie są jego przyczyny dowiedzą się Państwo z artykułu "O czym świadczy ból głowy?"

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**