

Kreon 10000, 150 mg, kapsułki, 50 szt. (import równoległy)

Nasza cena: 45,09 zł



Opis słownikowy

Dawka	10 000 J. PH.EUR.
Opakowanie	*50
Postać	KAPS.
Producent	INPHARM SP. Z O. O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PANCREATINUM

Opis produktu

Opis

Lek Kreon 10 000 zawiera enzymy trzustkowe pochodzenia wieprzowego.

Dawkowanie - Kreon 10000, 150 mg, kapsułki, 50 szt. (import równoległy)

Zalecane jest przyjmowanie połowy lub jednej trzeciej dawki całkowitej na początku posiłku, a pozostałej części w trakcie posiłku.

Kapsułki należy połykać w trakcie posiłków w stanie nienaruszonym, bez rozgryzania i żucia, popijając odpowiednią ilością płynu (np. ok. 100 ml). Jeżeli połykanie kapsułek sprawia trudności (np. w przypadku małych dzieci lub osób w podeszłym wieku), można je ostrożnie otworzyć i dodać minimikrosfery do miękkiego pokarmu (pH < 5,0) niewymagającego żucia lub przyjmować z płynem (pH < 5,0), np. sokiem owocowym. Mieszaninę minimikrosfer z pokarmem lub płynem należy zużyć natychmiast; nie wolno jej przechowywać.

Ważne jest zapewnienie odpowiedniego nawodnienia przez cały okres leczenia, zwłaszcza w okresach nasilonej utraty płynów. Niewłaściwe nawodnienie może wzmacniać zaparcia.

Dawkowanie - Kreon 10000, 150 mg, kapsułki, 50 szt. (import równoległy) w przypadku zwłóknienia torbielowatego trzustki:

Dawkowanie - Kreon 10000, 150 mg, kapsułki, 50 szt. (import równoległy) enzymów w przeliczeniu na masę ciała należy rozpoczynać od 1000 j. lipazy/kg mc./posiłek w przypadku dzieci w wieku poniżej czterech lat i 500 j. lipazy/kg mc./posiłek dla dzieci w wieku powyżej czterech lat.

Dawkowanie należy dostosować uwzględniając nasilenie choroby, kontrolę biegunek tłuszczowych i utrzymanie dobrego stanu odżywienia.

U większości pacjentów dawka powinna być mniejsza lub nie powinna przekraczać 10 000 j./kg masy ciała na dobę.

Dawkowanie w przypadku innych zaburzeń związanych z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki:

Dawkowanie - Kreon 10000, 150 mg, kapsułki, 50 szt. (import równoległy) powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb

każdego pacjenta w zależności od nasilenia zaburzeń trawienia i zawartości tłuszczu w pożywieniu. Dawka wymagana w przypadku głównego posiłku (śniadanie, obiad, kolacja) mieści się w przedziale od około 20 000 do 75 000 j. Ph.Eur. lipazy, a w przypadku przekąsek między posiłkami od około 5 000 do 25 000 j. Ph.Eur lipazy.

Najczęściej stosowana dawka początkowa preparatu wynosi od 10 000 do 25 000 j. Ph.Eur. lipazy w przypadku głównego posiłku. U niektórych pacjentów konieczne jest zastosowanie większych dawek w celu zminimalizowania biegunki tłuszczowej i utrzymania dobrego stanu odżywienia. Rutynowa praktyka kliniczna sugeruje, że należy podawać co najmniej 20 000 do 50 000 j. Ph.Eur. lipazy podczas posiłków.

Składniki - Kreon 10000, 150 mg, kapsułki, 50 szt. (import równoległy)

Substancją czynną leku jest 150 mg pankreatyny o aktywności: 10 000 j. Ph.Eur. lipazy; 8 000 j. Ph.Eur. amylazy; 600 j. Ph.Eur. proteazy. Inne składniki leku to: makrogol 4000, hypromelozy ftalan, dimetikon 1000, alkohol cetylowy, cytrynian trietylu. Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, bezwodny żelaza (III) tlenek (E 172), uwodniony żelaza (III) tlenek (E 172), żelaza (II, III) tlenek (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), laurylosiarczan sodu.

Działania

Lek Kreon 10 000 zawiera enzymy trzustkowe pochodzenia wieprzowego. Działają one poprzez trawienie pokarmów przechodzących przez jelito cienkie człowieka. Z tego powodu lek należy przyjmować w trakcie głównych posiłków lub przekąsek, co ułatwia jego dokładne wymieszanie z pokarmem.

Wskazania - Kreon 10000, 150 mg, kapsułki, 50 szt. (import równoległy)

Lek jest wskazany w leczeniu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki wywołanej:

- zwłóknieniem torbielowatym (mukowiscydozą)
- przewlekłym zapaleniem trzustki
- usunięciem trzustki (pankreatektomią)
- usunięciem żołądka (gastrektomią)
- zespoleniem żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II)
- zwężeniem przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu)
- zespołem Shwachmana-Diamonda.

Przeciwwskazania - Kreon 10000, 150 mg, kapsułki, 50 szt. (import równoległy)

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Przeciwwskazania - Kreon 10000, 150 mg, kapsułki, 50 szt. (import równoległy)

Często: ból brzucha. Niezbyt często: zaparcie, nieprawidłowe stolce, biegunka, nudności, wymioty; reakcje alergiczne i nadwrażliwość skóry.

Uwagi

Ciąża: Przed zastosowaniem leku Kreon 10 000 należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią: Lek Kreon 10 000 może być stosowany w czasie karmienia piersią.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

