

# Laboratoria Polfa Łódź Ibuprofen Max, 50 tabletek powlekanych

Nasza cena: 26,70 zł



## Opis słownikowy

Dawka	400MG
Opakowanie	*50
Postać	TABL.POWL.
Producent	Bio-Profil Polska Sp.z.o.o. Polska [PI]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	IBUPROFENUM

## Opis produktu

### Opis

## Laboratoria Polfa Łódź Ibuprofen Max, 50 tabletek powlekanych

### Lek działa:

- Przeciwbólowo
- Przeciwzapalnie
- Przeciwgorączkowo

Ból głowy to jedna z najbardziej powszechnych dolegliwości. Może być chorobą samą w sobie lub objawem innej poważniejszej choroby. W zależności od przyczyny bóle głowy mogą być pierwotne lub wtórne.

Do pierwszej grupy zaliczamy migrenę czy napięciowe bóle głowy. Bóle wtórne są wynikiem innego schorzenia w naszym organizmie. Czynnikiem wywołujących bóle głowy jest wiele, między innymi: niedobór lub brak snu, stres, stany chorobowe, urazy głowy czy szyi, a także nadmierny hałas i brak świeżego powietrza. W walce z bólem warto wybrać sprawdzone rozwiązanie, takie jak lek Ibuprofen Max z Laboratoria Polfa Łódź.

### Wskazania:

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (ból głowy, m.in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu). Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). Bolesne miesiączkowanie.

Dostępne wielkości opakowań: 10, 20, 50 tabletek

## Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego, skurczu oskrzeli, nieżyty błony śluzowej nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ. Ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie); perforacja lub krwawienia, również te występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Krwawienie mózgowo-naczyniowe lub inne czynne krwawienie. Zaburzenia hematopoezy (zaburzenia układu krwiotwórczego) o niewyjaśnionej przyczynie. Ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym nawodnieniem). Skaza krwotoczna oraz przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Ostatni trymestr ciąży. Dzieci i młodzież o masie ciała poniżej 40 kg (w wieku poniżej 12 lat).

## Skład:

1 tabletkę powlekaną: 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza, czerwień koszenilowa (E 124), azorubina (E 122).

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**