

Laboratoria Polfa Łódź przeziębienie i grypa smak cytrynowy saszetki x 8



Nasza cena: 14,17 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*8
Postać	Saszetki
Producent	Polfa Łódź S.a.
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Opatentowana kompozycja składników do walki z objawami przeziębienia i grypy:

- Objawy przeziębienia i grypy
- Gorączka
- Bóle mięśni i stawów
- Ból głowy w tym migrenowy
- ból zębów, nerwobóle

Przeziębienie i grypa to najczęstsze infekcje układu dróg oddechowych. Mimo wielu podobnych objawów, nie należy ich mylić.

Przeziębienie i grypa są wirusowymi chorobami zakaźnymi, przenoszonymi drogą kropelkową. Dopadają nas najczęściej w okresie jesienno-zimowym, gdy na zewnątrz panują zmienne warunki atmosferyczne.

Przeziębienie objawia się zapaleniem błony śluzowej gardła, nosa i zatok przynosowych. Pierwsze objawy występują 1-2 dni po zakażeniu i utrzymują się około 7-14 dni. Do infekcji dochodzi w wyniku kontaktu z chorą osobą czy zakażonymi przedmiotami np. słuchawką telefonu. Natomiast grypa wywołana jest przez jeden z trzech typów wirusów grypy (A, B lub C). Wysoka gorączka, dreszcze, uczucie rozbicia i bóle mięśniowo-stawowe należą do wczesnych objawów. W późniejszych etapach przebiegu infekcji towarzyszy ból gardła, katar czy uciążliwy kaszel.

Wskazania:

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym do stosowania doustnego w leczeniu objawów przeziębienia i grypy oraz:

- gorączki,
- bólów mięśni i stawów,
- bólów głowy w tym migrenowych,
- bólów zębów,

– nerwobólów.

Laboratoria Polfa Łódź przeziębienie i grypa jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne salicylany, kwas askorbowy, wapń lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Czynna choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego. Skazy krwotoczne, zaburzenia krzepnięcia krwi, stosowanie leków przeciwzakrzepowych. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (w cukrzycy, mocznicy, tężycze). Znacznie zwiększone stężenie wapnia we krwi. Astma współistniejąca z polipami nosa (wywołanymi lub nasilonymi przez kwas acetylosalicylowy). Ciężka niewydolność nerek, wątroby. Ciężka niewydolność serca. Okres ciąży i karmienia piersią. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Nie podawać dzieciom do lat 12. w przebiegu ospy wietrznej i grypy.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Skład:

Każda saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum), 300 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), 200 mg wapnia w postaci wapnia laktogluconianu (1550 mg Calcii lactogluconas) i substancje pomocnicze o znanym działaniu: sodu wodorowęglan (178 mg sodu) i aspartam.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.