

Lactovaginal 10 kapsułek dopochwowych

Nasza cena: 35,62 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*10 blister
Postać	Kapsułki dopochwowe
Producent	BIOMED-KRAKÓW WYTW.SUR.I SZCZEP. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	LACTOBACILLUS RHAMNOSUS 573

Opis produktu

Opis

LACTOVAGINAL® kapsułki dopochwowe

Produkt leczniczy dostępny bez recepty (OTC)

POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: nr 9636, wydane przez Prezesa URPL

Opis i zastosowanie:

LACTOVAGINAL® kapsułki dopochwowe zalecany jest w celu przywrócenia lub uzupełnienia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy: w stanach zapalnych narządów rodnych po leczeniu lekami przeciwdrobnoustrojowymi, przy występowaniu upławów oraz profilaktycznie. Lek przeznaczony dla kobiet i dziewcząt powyżej 16. roku życia.

Dawkowanie:

1-2 kapsułki na dobę (przy 2 kaps./dobę - jedna rano, druga na noc) przez 1 tydzień, o ile lekarz nie zaleci innego stosowania.

Sposób stosowania:

kapsułkę należy umieścić głęboko w pochwie zachowując zasady higieny osobistej.

Przeciwwskazania:

uczulenie na pałeczki Lactobacillus lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności:

należy zachować szczególną ostrożność u pacjentek z ciężkim zaburzeniem układu immunologicznego.

Działania niepożądane:

Lek jest dobrze tolerowany; Działania niepożądane występujące bardzo rzadko tj. <1/10 000: miejscowe działania niepożądane (swędzenie, pieczenie, zwiększona wydzielina z pochwy).

Przechowywanie:

Lodówka (2-8°C).

Informacja wyłącznie dla pacjenta: w okresie ważności lek można przechowywać: poza lodówką, w temperaturze do 25°C (do 4 tyg.)

Dostępne opakowania:

10 kaps, 14 kaps, 28 kaps

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.