

Lactulosum Amara syrop 150ml

Nasza cena: 11,92 zł



Opis słownikowy

Dawka	7,5 G/15ML
Opakowanie	150 ml
Postać	SYROP
Producent	AMARA ZAKŁ.FARMACEUTYCZNE POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	LACTULOSUM

Opis produktu

Opis

Substancją czynną preparatu jest laktuloza. Po podaniu doustnym, nie ulega ona trawieniu w jelicie cienkim, w niezmienionej postaci dociera do jelita grubego, gdzie pod wpływem flory bakteryjnej zostaje rozłożona do dwutlenku węgla i kwasów organicznych, które na drodze osmotycznej zwiększają ilość wody w jelicie grubym, pobudzają jego perystaltykę oraz zmiękczejają masy kałowe. Ponadto laktuloza powoduje zakwaszenie treści jelita grubego, przez co przyspiesza reakcję przekształcania amoniaku do jonów amonowych oraz zmniejsza wchłanianie amoniaku do krwi. Prowadzi to do zmniejszenia stężenia amoniaku we krwi.

Preparat jest wskazany w leczeniu zaparć oraz w zapobieganiu encefalopatii wątrobowej i jej leczeniu.

Przeciwwskazania:

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub jeżeli występuje u Ciebie niedrożność jelit. Osoby z nietolerancją galaktozy, galaktozemią, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy także nie powinny stosować tego preparatu.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Dzieci:

1 do 2 lat: 2,5 ml syropu - 2 razy na dobę,
2 do 5 lat: 2,5 ml syropu - 3 razy na dobę,
6 do 12 lat: 5 ml syropu - 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: 10 ml syropu - do 3 razy na dobę przez pierwsze 2 – 3 dni, a następnie 10 ml syropu 2 razy na dobę.

Zalecane dawkowanie dotyczy ostrych stanów chorobowych układu oddechowego.
W chorobach przewlekłych dawkę należy zmniejszyć do połowy.
Lek stosować ostrożnie u dzieci do 5 lat.
Nie należy stosować na noc.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.