

# Lactulosum Hasco (laktuloza), syrop, 2,5g/5ml, 150 ml



Nasza cena: 11,21 zł

## Opis słownikowy

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Dawka             | 2,5G/5ML                       |
| Opakowanie        | 150ml                          |
| Postać            | SYROP                          |
| Producent         | HASCO-LEK, WROCŁAW POLSKA [PL] |
| Rejestracja       | Lek bez recepty                |
| Substancja czynna | LACTULOSUM                     |

## Opis produktu

### Opis

Preparat należy do grupy leków osmotycznych o działaniu łagodnie przeczyszczającym.

### Co zawiera i jak działa?

Substancją czynną preparatu jest laktuloza. Po podaniu doustnym, nie ulega ona trawieniu w jelicie cienkim, w niezmienionej postaci dociera do jelita grubego, gdzie pod wpływem flory bakteryjnej zostaje rozłożona do dwutlenku węgla i kwasów organicznych, które na drodze osmotycznej zwiększają ilość wody w jelicie grubym, pobudzają jego perystaltykę oraz zmiękczejają masy kałowe. Ponadto laktuloza powoduje zakwaszenie treści jelita grubego, przez co przyspiesza reakcję przekształcania amoniaku do jonów amonowych oraz zmniejsza wchłanianie amoniaku do krwi. Prowadzi to do zmniejszenia stężenia amoniaku we krwi.

### Kiedy stosować?

Preparat jest wskazany w leczeniu zaparć oraz w zapobieganiu encefalopatii wątrobowej i jej leczeniu.

### Kiedy niestosować?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub jeżeli występuje u Ciebie niedrożność jelit. Osoby z nietolerancją galaktozy, galaktozemią, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy także nie powinny stosować tego preparatu.

### Dawkowanie:

Preparat ma postać syropu doustnego. W zaparciach u dorosłych stosuje się początkowo przez pierwsze 3 dni 45 ml raz na dobę przed śniadaniem lub 15 ml 3 razy na dobę przed posiłkami. Dawka podtrzymująca 15 ml na czczo. U dzieci po 3. rż. stosuje się początkowo

5–15 ml na dobę, u dzieci do 3. rż. 5 ml na dobę, a u niemowląt 2,5 ml na dobę, następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni do uzyskania prawidłowych wypróżnień. W zapobieganiu encefalopatii wątrobowej i jej leczeniu stosuje się u dorosłych 120–180 ml na dobę w 3–4 dawkach podzielonych; dawki należy dostosować, tak aby liczba luźnych stolców nie była większa niż 2–3 na dobę.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**