

Lactulosum Polfarmex, syrop, 150 ml



Nasza cena: 11,03 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	150 ml
Postać	SYROP
Producent	POLFARMEX S.A. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	LACTULOSUM

Opis produktu

Opis

Lek łagodnie przeczyszczający.

Dawkowanie - Lactulosum Polfarmex, syrop, 150 ml

- przeczyszczająco: doustnie, zazwyczaj 30-45 ml (2-3 łyżki stołowe) przed śniadaniem lub po 15 ml (1 łyżka) 3 razy na dobę przed posiłkami. Po uzyskaniu efektu - 15 ml syropu na czczo.
- w niewydolności wątroby: doustnie, 100-180 ml na dobę w 4-6 dawkach.
- Dzieci - przeczyszczająco: początkowo, niemowlęta - 2,5 ml, dzieci do lat 3-5 ml, powyżej 3 lat - 15 ml na dobę. Następnie dawkę leku można stopniowo zwiększać co 3 dni, aż do uzyskania prawidłowych wypróżnień. Jeżeli wystąpią wzdęcia brzucha, należy zmniejszyć dawkę do tolerowanej przez dziecko.

Zaleca się podawanie syropu z laktulozą po rozcieńczeniu wodą lub sokiem owocowym.

Składniki - Lactulosum Polfarmex, syrop, 150 ml

15 ml syropu zawiera 7,5 g laktulozy

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, aromat mangora płynny, woda oczyszczona

Działania

Laktuloza - syntetyczny dwucukier - w okrężnicy jest źródłem energii dla bakterii sacharolitycznych, hamujących rozwój flory proteolitycznej. Hamując procesy gnilne ogranicza wytwarzanie amoniaku, a obniżając pH środowiska okrężnicy zmniejsza wchłanianie soli amonowych, które zostają wydalone z kałem. Pobudza perystaltykę jelit i działa osmotycznie przeczyszczająco. Laktuloza sprzyja leczeniu chorób przewodu pokarmowego, łagodzi objawy śpiączki oraz zapobiega i leczy encefalopatię systemu wrotnego.

Wskazania - Lactulosum Polfarmex, syrop, 150 ml

Preparat stosowany w przypadku przewlekłych zaparć, ostrej niewydolności wątroby ze stanami przedśpiączkowymi i śpiączką, przewlekłej niewydolności wątroby przebiegającej z podwyższeniem stężenia amoniaku we krwi.

Przeciwwskazania - Lactulosum Polfarmex, syrop, 150 ml

Nadwrażliwość na substancję czynną i (lub) którykolwiek składnik preparatu, niedrożność jelit, galaktozemia.

Przeciwwskazania - Lactulosum Polfarmex, syrop, 150 ml

W początkowym okresie stosowania mogą wystąpić bóle brzucha. Niekiedy po zastosowaniu dużych dawek obserwuje się nudności, biegunkę, wzdęcia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.