

## Lamisilatt, krem 1%, 15 g



Nasza cena: 31,09 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	15 g
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TERBINAFINUM

### Opis produktu

#### Opis

### Lamisilatt, krem 1%, 15 g

Lek przeciwgrzybiczy, który stosuje się miejscowo.

### Dawkowanie - Lamisilatt, krem 1%, 15 g

Preparat Lamisilatt ma postać kremu przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Preparat należy stosować na czystą i suchą skórę. Preparat Lamisilatt należy stosować zgodnie z zaleceniami.

U dorosłych i dzieci po 12 roku życia:

Niewielką ilość kremu należy nanieść na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry i lekko wetrzeć. Jeżeli preparat stosowany jest na obszar zakażony znajdujący się w fałdach skórnych, powierzchnię, na którą naniesiono preparat należy przykryć gazą (zwłaszcza jeżeli preparat jest stosowany na noc).

Każdorazowo po nałożeniu preparatu ręce należy umyć wodą i mydłem.

W grzybicy stóp (z wyłączeniem grzybicy podeszwy stopy), fałdów skórnych, skóry gładkiej stosować 1 raz na dobę przez 1 tydzień. W łupieżu pstrym krem stosować 1 raz na dobę przez 2 tygodnie a aerozol stosować 2 razy na dobę przez 1 tydzień. W grzybicy podeszwowej stóp (obejmującej podeszwę i boczne powierzchnie stóp) krem stosować 2 razy na dobę przez 2 tygodnie.

Stosowanie preparatu należy kontynuować przez zalecany okres czasu nawet w przypadku wcześniejszego ustąpienia objawów. Pomoże to zapobiegać nawrotom choroby.

W celu uniknięcia ponownego zakażenia należy przestrzegać zasad higieny osobistej.

Jeżeli objawy nasilią się lub nie ustąpią po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia należy skonsultować się z lekarzem.

Preparatu nie należy stosować u dzieci do 12. roku życia.

### Składniki - Lamisilatt, krem 1%, 15 g

Substancją czynną preparatu jest terbinafina 10mg/g (1%substancji aktywnej), pochodna alliloaminy o działaniu przeciwgrzybiczym. Skuteczna wobec wielu gatunków dermatofitów, pleśni, a także drożdżaków i niektórych innych grzybów chorobotwórczych

Substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu, alkohol benzylowy, sorbitanu monostearynian, cetylu palmitynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, polisorbat 60, izopropylu myrystynian, woda oczyszczona.

## Działania

Działanie terbinafiny, podobnie jak leków przeciwgrzybiczych z grupy pochodnych imidazolu i triazolu, prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórek grzyba. Po podaniu miejscowym na skórę terbinafina osiąga duże stężenie w warstwie rogowej naskórka. Wchłanianie do krwi jest znikome i w związku z tym, działanie ogólnoustrojowe jest niewielkie.

## Wskazania - Lamisilatt, krem 1%, 15 g

W leczeniu miejscowym:

- grzybicy stóp
- grzybicy skóry gładkiej
- grzybicy fałdów skórnych
- łupieżu pstrego
- drożdży skóry

## Przeciwwskazania - Lamisilatt, krem 1%, 15 g

Lamisilatt nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na terbinafinę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą.

## Przeciwwskazania - Lamisilatt, krem 1%, 15 g

Mogą wystąpić poradycznie zaczerwienienie, świąd i pieczenie skóry, nie wymagające zazwyczaj odstawienia leku. Rzadko występują reakcje nadwrażliwości (wysypka skórna, pokrzywka), które są wskazaniem do odstawienia preparatu.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**