

Lamisilatt, krem 15g, (Import równoległy)



Nasza cena: 26,03 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	15 g
Postać	KREM
Producent	DELFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	TERBINAFINUM

Opis produktu

Opis

Lamisilatt, krem 15g, (Import równoległy)

Lek ten posiada właściwości przeciwgrzybicze wobec różnorodnych gatunków grzybów odpowiedzialnych za schorzenia skóry u ludzi.

Dawkowanie - Lamisilatt, krem 15g, (Import równoległy)

Przed zastosowaniem leku należy oczyścić i osuszyć leczone miejsca, a następnie lekko wcierając nanieść na nie niewielką ilość kremu. Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.: cienką warstwę preparatu nanosi się raz dziennie na miejsca chorobowo zmienione i lekko wciera. W zakażeniach umiejscowionych w fałdach skórnych preparat nakłada się w opatrunku zamkniętym, zwłaszcza na noc. W grzybicy stóp, skóry gładkiej, fałdów skórnych i kandydozie skóry lek stosuje się przez 1 tydzień, w łupieżu pstym - przez 2 tyg.

Składniki - Lamisilatt, krem 15g, (Import równoległy)

Lamisilatt krem to biały, jednorodny i połyskujący preparat. Zawiera 10 mg/g (1%) substancji aktywnej - chlorowodorku terbinafiny. Substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu, alkohol benzylowy, sorbitanu monostearnian, cetylu palmitynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, polisorbata 60, izopropylu myrystynian, woda oczyszczona.

Działania

Lek przeciwgrzybiczy z grupy alliloamin. Wywiera działanie grzybobójcze wobec dermatofitów, pleśni i niektórych grzybów dimorficznych oraz działanie grzybobójcze lub grzybostatyczne wobec drożdżaków. Terbinafina hamuje biosyntezę ergosterolu w komórkach grzybów.

Wskazania - Lamisilatt, krem 15g, (Import równoległy)

Miejscowe leczenie:

- grzybicy stóp,
- grzybicy fałdów skórnych,
- grzybicy skóry gładkiej,
- łupieżu pstrego,
- drożdżycy skóry.

Przeciwwskazania - Lamisilatt, krem 15g, (Import równoległy)

Nadwrażliwość na terbinafinę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą.

Przeciwwskazania - Lamisilatt, krem 15g, (Import równoległy)

Sporadycznie zaczerwienienie, świąd i pieczenie skóry, nie wymagające zazwyczaj odstawienia leku. Rzadko występują reakcje nadwrażliwości (wysypka skórna, pokrzywka), które są wskazaniem do odstawienia preparatu.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.