

Laremid, 2mg, 10 tabletek



Nasza cena: 10,57 zł

Opis słownikowy

Dawka	2MG
Opakowanie	*10
Postać	Tabletki
Producent	POLFA S.A. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	LOPERAMIDUM

Opis produktu

Opis

Laremid jest lekiem przeciwbiegunkowym.

Dawkowanie - Laremid, 2mg, 10 tabletek

- ostra biegunka: 2 tabletki dla dorosłych i 1 tabletkę dla dzieci. Następnie 1 tabletkę po każdym kolejnym wolnym stolcu.
- przewlekła biegunka: początkowa dawka leku wynosi 2 tabletki na dobę dla dorosłych i 1 tabletkę na dobę dla dzieci. Tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się przez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek na dobę.

Składniki - Laremid, 2mg, 10 tabletek

1 tabletkę zawiera:

- chlorowodorek loperamidu 2 mg
- substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą, powidon K-25, kwas stearynowy

Działania

Lek wydłuża czas przejścia pokarmu przez przewód pokarmowy, zmniejsza wydalanie wody i elektrolitów oraz zmniejsza natychmiastową potrzebę wypróżniania. Skutkiem działania leku jest zmniejszenie częstości i liczby wypróżnień.

Wskazania - Laremid, 2mg, 10 tabletek

- w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki,
- w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji u pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego.

Przeciwwskazania - Laremid, 2mg, 10 tabletek

- nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu,
- dzieci poniżej 6 lat,
- leczenie zasadnicze w stanach takich jak: ostra czerwonka przebiegająca z obecnością krwi w kale i wysoką gorączką, ostra faza wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ostra biegunka wywołana przez bakterie chorobotwórcze lub rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.

Przeciwwskazania - Laremid, 2mg, 10 tabletek

Dyskomfort i ból w jamie brzusznej, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zmęczenie, senność, zawroty głowy, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów.

Bardzo rzadko: pokrzywka, świąd, wysypka, pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, niekiedy ciężkie przypadki nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny, ból brzucha, niedrożność jelit, wzdęcia brzucha, nudności, zaparcia, wymioty, rozszerzenie okrężnicy, toksyczne rozszerzenie okrężnicy, wzdęcia z oddawaniem wiatrów i niestrawność, pojedyncze przypadki zatrzymania moczu, zawroty głowy, senność

Uwagi

Lek należy odstawić jeżeli wystąpi zaparcie lub wzdęcie brzucha.

Lek zawiera laktozę. W przypadku wcześniejszego stwierdzenia u pacjenta nietolerancji niektórych cukrów należy przed przyjęciem leku skonsultować się z lekarzem.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.