

## Laremid tabletki 2mg x 20

Nasza cena: 14,58 zł



### Opis słownikowy

Dawka	2 MG
Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	POLFA S.A. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	LOPERAMIDUM

### Opis produktu

#### Opis

Laremid jest lekiem przeciwbiegunkowym.

#### Dawkowanie:

- ostra biegunka: 2 tabletki dla dorosłych i 1 tabletki dla dzieci. Następnie 1 tabletki po każdym kolejnym wolnym stolcu.
- przewlekła biegunka: początkowa dawka leku wynosi 2 tabletki na dobę dla dorosłych i 1 tabletki na dobę dla dzieci. Tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się przez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek na dobę.

#### Składniki:

- 1 tabletki zawiera:
- chlorowodorek loperamidu 2 mg
  - substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą, powidon K-25, kwas stearynowy

#### Działanie:

Lek wydłuża czas przejścia pokarmu przez przewód pokarmowy, zmniejsza wydalanie wody i elektrolitów oraz zmniejsza natychmiastową potrzebę wypróżnienia. Skutkiem działania leku jest zmniejszenie częstości i liczby wypróżnień.

#### Wskazania:

- w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki,
- w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji u pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego.

### **Przeciwwskazania:**

- nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu,
- dzieci poniżej 6 lat,
- leczenie zasadnicze w stanach takich jak: ostra czerwonka przebiegająca z obecnością krwi w kale i wysoką gorączką, ostra faza wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ostra biegunka wywołana przez bakterie chorobotwórcze lub rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.

Dyskomfort i ból w jamie brzusznej, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zmęczenie, senność, zawroty głowy, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów.

Bardzo rzadko: pokrzywka, świąd, wysypka, pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, niekiedy ciężkie przypadki nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny, ból brzucha, niedrożność jelit, wzdęcia brzucha, nudności, zaparcia, wymioty, rozszerzenie okrężnicy, toksyczne rozszerzenie okrężnicy, wzdęcia z oddawaniem wiatrów i niestrawność, pojedyncze przypadki zatrzymania moczu, zawroty głowy, senność

### **Uwagi:**

Lek należy odstawić jeżeli wystąpi zaparcie lub wzdęcie brzucha.

Lek zawiera laktozę. W przypadku wcześniejszego stwierdzenia u pacjenta nietolerancji niektórych cukrów należy przed przyjęciem leku skonsultować się z lekarzem.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**