

# Lehning Rexorubia Granulat 350g brak mikroelementów soli mineralnych

Nasza cena: 31,59 zł

## Opis słownikowy

Producent	LEHNING FRANCJA [FR]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HOMEOPATHIC MEDICINALIS PRODUCT

## Opis produktu

### Opis

Lek wspomagający w leczeniu demineralizacji kośćca, zaburzeń gospodarki mineralnej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń wapniowo-magnezowo-fosforanowych. Niedobór mikroelementów i soli mineralnych w każdym wieku. Wskazany w okresie gwałtownego wzrostu, uprawiania sportu i leczenia złamań.

### Działanie:

Rexorubia stanowi kompozycję biologicznie czynnych składników bardzo korzystnie działających na organizm. Preparat ten stosuje się w przypadku konieczności wyrównania niedoborów mikroelementów i soli mineralnych. Lek pobudza przyswajanie z diety odpowiednich składników w przypadku demineralizacji organizmu. Rexorubia ma właściwości rewitalizujące. Wyrównuje niedobory oraz ułatwia przyswajanie z diety mikroelementów i soli mineralnych. W przypadku demineralizacji przywraca siły zarówno młodzieży jak i osobom starszym.

### Działa wspomagająco przy:

- demineralizacji u rekonwalescentów
- demineralizacji w każdym wieku
- profilaktyce demineralizacji u sportowców
- profilaktyce osteoporozy.

**Rexorubia** to preparat przeciw demineralizacji,

- charakteryzuje się doskonałą tolerancją i brakiem efektów ubocznych. Skuteczny przy bólach kostnych i demineralizacji (powoduje wzrost mineralizacji tkanki kostnej).

Rexorubia doskonale nadaje się do leczenia demineralizacji u kobiet, młodocianych i sportowców.

### Lek jest skuteczny w łagodzeniu skutków:

- anemii,

- krzywicy,
- próchnicy zębów,
- neurastenii,
- łamliwości paznokci,
- wypadania włosów.

## Dawkowanie:

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej : małe dzieci - 1 łyżeczka granulatu rozpuścić w niewielkiej ilości wody lub mleka i podawać 3 x dziennie, 1 godz. przed posiłkami. Dorośli i starsze dzieci - 1 łyżeczka 3 x dziennie, 1 godz. przed posiłkami.

Profilaktycznie zaleca się stosowanie leku na wiosnę i na jesieni przez 2 - 3 miesiące. Leczniczo do wyrównania niedoborów.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**