

# Lercaprel 10 mg + 10 mg 28 tabletek

Nasza cena: 18,41 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,01G+0,01G
Opakowanie	*28
Postać	TABL.POWL.
Producent	RECORDATI IRELAND LTD IRLANDIA [IE]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ENALAPRILUM, LERCANIDIPINUM

## Opis produktu

### Opis

Lercaprel to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne obniżające ciśnienie tętnicze - inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), enalapryli antagonistę wapnia, lercanidypinę.

Lercaprel jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów dorosłych, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas leczenia samą lercanidypiną w dawce 10 mg. Leku Lercaprel nie należy stosować w leczeniu początkowym nadciśnienia tętniczego.

### Dawkowanie i sposób zażywania:

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

#### Stosowanie u osób dorosłych:

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletkaraz na dobę, przyjmowana codziennie o tej samej porze.

Tabletkę najlepiej zażywać rano, co najmniej 15 minut przed śniadaniem. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

#### Stosowanie u osób z zaburzeniem czynności nerek/pacjentów w podeszłym wieku:

Lekarz określi odpowiednią dawkę leku w zależności od czynności nerek

### Uwaga:

**Przyjmowanie większej niż zalecana dawki leku Lercaprel**

- Nie należy przekraczać zalecanej dawki.
- W razie zażycia większej niż zalecana dawki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala.
- Należy zabrać opakowanie leku ze sobą.
- Zażycie dawki większej niż zalecana może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz nieregularną lub przyspieszoną czynność serca.

### Pominięcie przyjęcia leku Lercaprel

- W przypadku pominięcia dawki należy opuścić pominiętą dawkę.
- Następnie należy zażyć kolejną dawkę o stałej porze.
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
- Przerwanie przyjmowania leku Lercaprel
- Nie należy przerywać przyjmowania tego leku, chyba że tak zaleci lekarz.
- W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### Skład:

Substancjami czynnymi leku są enalaprylu maleinian i lerkanidypiny chlorowodorek. Każda tabletką powlekana zawiera 10 mg enalaprylu maleinianu (co odpowiada 7,64mg enalaprylu) i 10mg lerkanidypiny chlorowodoru (co odpowiada 9,44mg lerkanidypiny).

### Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki-laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K-30, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian Otoczka tabletki-hypromeloza5cP, tytanu dwutlenek (E171), talk, makrogol6000

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.