

# Lercaprel 20 mg + 10 mg 28 tabletek powlekanych

Nasza cena: 23,26 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,02G+0,01G
Opakowanie	*28
Postać	TABL.POWL.
Producent	RECORDATI IRELAND LTD IRLANDIA [IE]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ENALAPRILUM, LERCANIDIPINUM

## Opis produktu

### Opis

Lercaprel to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne obniżające ciśnienie tętnicze

-inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), enalapryli antagonistę wapnia, lercanidypinę.

Lercaprel jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów dorosłych, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas leczenia samymenalaprylem w dawce 20 mg. Leku Lercaprelnie należy stosować w leczeniu początkowym nadciśnienia tętniczego

### Jak przyjmować lek?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

### Stosowanie u osób dorosłych:

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, zazwyczaj stosowana dawka to jednatabletka raz na dobę, przyjmowana codziennie o tej samej porze. Tabletkę najlepiej zażywać rano, co najmniej 15 minut przed śniadaniem. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Stosowanie u osób z zaburzeniem czynności nerek/pacjentów w podeszłym wieku:

Lekarz określi odpowiednią dawkę leku w zależności od czynności nerek. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. W razie zażycia większej niż zalecana dawki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Należy zabrać opakowanie leku ze sobą. Zażycie dawki większej niż zalecana może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz nieregularną lub przyspieszoną czynność serca.

### Pominięcie przyjęcia leku Lercaprel

W przypadku pominięcia dawki należy opuścić pominiętą dawkę.

-Następnie należy zażyć kolejną dawkę o stałej porze.

-Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

## Przerwanie przyjmowania leku Lercaprel

-Nie należy przerywać przyjmowania tego leku, chyba że tak zaleci lekarz.

-W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## Skład:

Co zawiera Lercaprel-Substancjami czynnymi leku są enalaprylu maleinian i lerkanidypiny chlorowodorek.

Każda tabletką powlekana zawiera: 20 mg enalaprylu maleinianu (co odpowiada 15,29 mg enalaprylu) i 10 mg lerkanidypiny chlorowodoru(co odpowiada 9,44 mg lerkanidypiny).

## Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K-30, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian Otoczka tabletki hypromeloza 5cP, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000, żółcień chinolinowa, lak (E 104), żelaza tlenek żółty (E 172)

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.