

Levopront syrop 120ml



Nasza cena: 26,61 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	120ml
Postać	SYROP
Producent	Dompe S.p.a Włochy [It]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	LEVODROPROPIZINUM

Opis produktu

Opis

Levopront syrop 120ml

Substancja czynna leku **Levopront** jest **Lewodropropizyna** cechuje się głównie obwodowym (o punkcie uchwytu w oskrzelach i tchawicy) działaniem przeciwkaszlowym oraz działaniem przeciwuczuleniowym i znoszącym skurcz oskrzeli; u zwierząt stwierdzono także działanie miejscowo znieczulające leku. Wiele dowodów eksperymentalnych wskazuje na jej skuteczność kliniczną w hamowaniu kaszlu o różnym pochodzeniu, jak np. kaszel w przebiegu raka płuca, kaszel związany z zakażeniami górnych dróg oddechowych czy krztusiec.

Lewodropropizyna szybko wchłania się po doustnym podaniu u ludzi i ulega szybkiej dystrybucji w organizmie. Lek wydalany jest głównie z moczem, w postaci niezmienionej oraz w postaci metabolitów. Lek Levopront wskazany jest w objawowym leczeniu kaszlu.

Sposób użycia

Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia kaszlu lub zgodnie z zaleceniem lekarza. W każdym przypadku, gdy kaszel nie ustępuje po dwóch tygodniach leczenia zaleca się przerwać zażywanie leku i zasięgnąć porady lekarza. Należy pamiętać, że kaszel jest objawem i należy rozpoznać, a następnie leczyć chorobę, która jest jego przyczyną. Do butelki z syropem dołączona jest miarka pozwalająca odmierzyć m.in. 3, 5 i 10 ml.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej dawka lek. wynosi:

Dorośli:

10 ml syropu do 3 razy dziennie, w odstępach co najmniej 6 godzin.

Dzieci:

10-20 kg: 3ml syropu 3 razy dziennie;

20-30 kg: 5 ml syropu 3 razy dziennie.

Działania niepożądane

Nie należy stosować syropu Levopront, gdy występuje uczulenie na jakikolwiek składnik zawarty w leku, a w szczególności na substancję czynną, którą jest lewodropropizyna.

Zastosowanie syropu może prowadzić do takich skutków ubocznych jak zaburzenia trawienne, wymioty, biegunka bóle brzucha, drżenie, parestezje, duszności, kaszel, reakcje alergiczne, osłabienie, zaburzenia rytmu serca i inne.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych zalecamy skontaktowanie się ze specjalistą.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować syropu Levopront, gdy występuje uczulenie na jakikolwiek składnik zawarty w leku, a w szczególności na substancję czynną, którą jest lewodropropizyna.

Zastosowanie syropu może prowadzić do takich skutków ubocznych jak zaburzenia trawienne, wymioty, biegunka bóle brzucha, drżenie, parestezje, duszności, kaszel, reakcje alergiczne, osłabienie, zaburzenia rytmu serca i inne.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych zalecamy skontaktowanie się ze specjalistą.

Ulotka do pobrania

Levopront syrop 120 ml

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.