

## Liotion 1000 8,5 mg/g żel, 100 g



Nasza cena: 63,71 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	100 g
Postać	ZEL
Producent	MENARINI A. PHARM.INDUSTRI WŁOCHY [IT]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HEPARINUM

### Opis produktu

#### Opis

### Liotion 1000 8,5 mg/g żel, 100 g

Liotion 1000 jest lekiem w postaci żelu do stosowania na skórę.

#### Skład:

Substancja czynna leku jest heparyna sodowa. 1g żelu zawiera 8,5mg (1000j.m.) heparyny sodowej.

Inne składniki leku to: karbomer 940, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, trietanolamina, woda oczyszczona.

#### Działanie:

Zawiera heparynę, wykazuje działanie miejscowe przeciwzakrzepowe, przeciwobrzękowe i przeciwzapalne.

#### Wskazania:

Preparat stosowany:

- w chorobach żył powierzchownych, a także po wlewach lub wstrzyknięciach,
- w zakrzepowym zapaleniu żył,
- zespole objawów żylakowatości,
- żylakach kończyn dolnych,
- krwiakach,
- w stłuczeniach,
- obrzękach
- w zapobieganiu oraz leczeniu przerostłych blizn i bliznowców.

## Dawkowanie:

Lioton 1000 przeznaczony jest do stosowania na skórę. Lek należy stosować od 1 do 3 razy na dobę nakładając 3-10 cm żelu na powierzchnię skóry i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia żelu.

W przypadku ostrych obrzęków po tępych urazach zaleca się stosowanie leku przez okres do 10 dni, a w przypadku leczenia chorób żył powierzchownych od 1 do 2 tygodni.

## Przeciwwskazania:

Leku Lioton 1000 nie należy stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub którykolwiek ze składników leku (ze względu na obecność hydroksybenzoesanów metylu i propylu jako substancji pomocniczych nie należy stosować leku u osób z alergią na parabeny).

Leku nie należy stosować na: otwarte rany lub sączące się zmiany skórne. Nie stosować w okolicy oczu, nosa i ust. Leku Lioton 1000 nie należy stosować w przypadku krwawienia.

## Dzieci poniżej 12 roku życia.

Podczas ciąży lub w okresie karmienia piersią przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Lioton 1000 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy reakcji alergicznych lub objawy reakcji pseudoalergicznyc. W takich przypadkach leczenie należy przerwać. U niektórych pacjentów, u których pierwotnie występuje czerwienica prawdziwa, po podaniu miejscowym heparyny w żelu mogą pojawić się zmiany skórne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**

