

Lioton 1000, żel, 30 g



Nasza cena: 27,67 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 g
Postać	ZEL
Producent	MENARINI A. PHARM.INDUSTRI WŁOCHY [IT]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HEPARINUM

Opis produktu

Opis

Lioton 1000, żel, 30 g

Lioton 1000 jest lekiem w postaci żelu do stosowania na skórę.

Dawkowanie - Lioton 1000, żel, 30 g

Lioton 1000 przeznaczony jest do stosowania na skórę. Lek należy stosować od 1 do 3 razy na dobę nakładając 3-10 cm żelu na powierzchnię skóry i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia żelu.

W przypadku ostrych obrzęków po tępych urazach zaleca się stosowanie leku przez okres do 10 dni, a w przypadku leczenia chorób żył powierzchniowych od 1 do 2 tygodni.

Składniki - Lioton 1000, żel, 30 g

Substancja czynna leku jest heparyna sodowa. 1g żelu zawiera 8,5mg (1000j.m.) heparyny sodowej.

Inne składniki leku to: karbomer 940, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, trietanolamina, woda oczyszczona.

Działania

Zawiera heparynę, wykazuje działanie miejscowe przeciwzakrzepowe, przeciwobrzękowe i przeciwzapalne.

Wskazania - Lioton 1000, żel, 30 g

Preparat stosowany:

- w chorobach żył powierzchownych, a także po wlewach lub wstrzyknięciach,
- w zakrzepowym zapaleniu żył,
- zespolu objawów żylakowatości,
- żylakach kończyn dolnych,
- krwiakach.,
- w stłuczeniach,
- obrzękach
- w zapobieganiu oraz leczeniu przerostych blizn i bliznowców.

Przeciwwskazania - Lioton 1000, żel, 30 g

Leku Lioton 1000 nie należy stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub którykolwiek ze składników leku (ze względu na obecność hydroksybenzoesanów metylu i propylu jako substancji pomocniczych nie należy stosować leku u osób z alergią na parabeny).

Leku nie należy stosować na: otwarte rany lub sączące się zmiany skórne. Nie stosować w okolicy oczu, nosa i ust. Leku Lioton 1000 nie należy stosować w przypadku krwawienia.

Dzieci poniżej 12 roku życia.

Podczas ciąży lub w okresie karmienia piersią przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Przeciwwskazania - Lioton 1000, żel, 30 g

Jak każdy lek, Lioton 1000 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy reakcji alergicznych lub objawy reakcji pseudoalergicznych. W takich przypadkach leczenie należy przerwać. U niektórych pacjentów, u których pierwotnie występuje czerwienica prawdziwa, po podaniu miejscowym heparyny w żelu mogą pojawić się zmiany skórne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.