

LIOTON 1000 żel 50g



Nasza cena: 36,87 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	50 g
Postać	ZEL
Producent	MENARINI A. PHARM.INDUSTRI WŁOCHY [IT]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	HEPARINUM

Opis produktu

Opis

LIOTON 1000 żel 50g

Wskazania

Leczenie wspomagające w chorobach żył powierzchownych takich, jak:

- zapalenia żył,
- zakrzepowym zapaleniu żył,
- żylakach kończyn dolnych;
- krwiakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach.

Dawkowanie

Lek należy stosować od 1 do 3 razy na dobę nakładając 3-10cm żelu na powierzchnię skóry i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia żelu.

W przypadku ostrych obrzęków po tępych urazach zaleca się stosowanie leku przez okres do 10 dni a w przypadku leczenia chorób żył powierzchownych od 1 do 2 tygodni.

Skład

Substancja czynna leku jest heparyna sodowa. 1g żelu zawiera 8,5mg heparyny sodowej.

Inne składniki: karbomer 940, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, trietanolamina, woda oczyszczona.

Działanie

Zawiera heparynę, wykazuje działanie miejscowe przeciwzakrzepowe, przeciwobrzękowe i przeciwzapalne.

Przeciwwskazania

Produktu leczniczego Lioton 1000 nie należy stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu leczniczego. Ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i parahydroksybenzoesanu propylu, jako substancji pomocniczych, nie należy stosować produktu leczniczego u osób z alergią na parabeny.

Możliwe działania nieporządane

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy reakcji alergicznych lub objawy reakcji pseudoalergicznnych. W takich przypadkach leczenie należy przerwać. U niektórych pacjentów u których pierwotnie występuje czerwienica prawdziwa, po podaniu miejscowym heparyny w żelu mogą pojawić się zmiany skórne.

Uwagi

O tym jak prawidłowo zadbać o swoje nogi dowiedzą się Państwo z artykułu "Problem z nóg - problem z głowy".

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.