

Lipancia 8000 j., 50 kapsułek



Nasza cena: 39,20 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*50
Postać	KAPS.
Producent	POLFA S.A. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	PANCREATINUM

Opis produktu

Opis

Lipancia 8000 j., 50 kapsułek

Preparat zawierający pankreatynę.

Dawkowanie - Lipancia 8000 j., kapsułki, 50 szt.

Doustnie podczas posiłku popijając każdą kapsułkę płynem. Kapsułkę należy połykać w całości nie należy jej żuć ani kruszyć. Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych: 2-4 kapsułki do każdego posiłku

Składniki - Lipancia 8000 j., kapsułki, 50 szt.

1 kapsułka zawiera substancję czynną: pankreatynę o aktywności:

- lipazy- 8000j. Ph. Eur.
- amylazy- 5750j. Ph. Eur.
- proteazy- 450j. Ph. Eur.

Substancje pomocnicze: trójetylu cytrynian, kopolimer kwasu metakrylowego, żelatyna, żelza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek (E171)

Działania

Pankreatyna zawiera enzymy trzustkowe pochodzenia zwierzęcego: lipazę- rozkładającą tłuszcze, amylazę rozkładającą skrobię oraz proteazy powodujące rozkład białek.

Preparat umożliwia trawienie, np. po wycięciu trzustki oraz poprawia trawienie w stanach zmniejszonego wydzielania enzymów. Ułatwia przyswojenie składników odżywczych zawartych w pożywieniu oraz usuwa zaburzenia trawienia. Zapobiega wystąpieniu objawów

takich jak: uczucie przepełnienia żołądka po jedzeniu, wzdęcia, bóle brzucha, nudności, wymioty.

Wskazania - Lipancrea 8000 j., kapsułki, 50 szt.

Upośledzenie czynności trzustki spowodowane:

- przewlekłym zapaleniem trzustki
- wycięciem trzustki bądź jej części
- wycięciem żołądka
- zwężeniem dróg żółciowych spowodowanych chorobą nowotworową
- mukowiscydozą- chorobą dziedziczną objawiającą się tym, że organizm produkuje nadmiernie lepki śluz, który powoduje poważne zaburzenia w narządach, np. płucach, trzustce.

Przeciwwskazania - Lipancrea 8000 j., kapsułki, 50 szt.

Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu, ostre zapalenie trzustki objawiające się bardzo silnymi bólami w górnej części brzucha z nudnościami i wymiotami, które nie ustępują po typowych lekach przeciwbólowych dostępnych bez recepty

Przeciwwskazania - Lipancrea 8000 j., kapsułki, 50 szt.

Często: ból brzucha

Niezbyt często: zaparcia, biegunka, nudności, wymioty, reakcje alergiczne, nadwrażliwość skóry.

Bardzo rzadko: świąd skóry, nie wymagający odstawienia leku

W czasie stosowania leku mogą również wystąpić: objawy uczulenia, podrażnienia w jamie ustnej lub okolicy odbytu, podwyższenie stężenia kwasu moczowego w moczu

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.