

Lipanthyl 267 mg 30 kapsułek

Nasza cena: 14,27 zł

Opis słownikowy

Dawka	267MG
Opakowanie	*30
Postać	KAPS.
Producent	LAB.FOURNIER FRANCJA [FR]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	FENOFIBRATUM

Opis produktu

Opis

Wskazania do stosowania leku Lipanthyl

Dawkę 267 mg przepisuje lekarz jako dodatek do diety oraz innych terapii nefarmakologicznych, takich jak ćwiczenia fizyczne. Lek sprawdza się również w leczeniu ciężkiej hipertrójglicydemii z niskim stężeniem cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) lub bez. Lipanthyl przepisuje się z polecenia lekarza pacjentom z mieszaną hiperlipidemią, jeżeli stosowanie statyn jest przeciwwskazane lub nie są one tolerowane.

Dawkowanie:

Dawka jest ustalana indywidualnie przez lekarza na podstawie stanu zdrowia oraz wyników badań. W trakcie stosowania leczenia Lipanthylem należy regularnie przeprowadzać kontrolę lipidów w surowicy, aby sprawdzić skuteczność leczenia.

Zazwyczaj przepisywana jest dawka 200 mg/na dobę w jednej aplikacji. Jeśli wymagane jest zwiększenie dawki, to stosuje się z reguły 267 mg raz/dobę. O tym, czy zwiększyć dawkę decyduje lekarz. Lek nie powinien być wdrażany w przypadku leczenia u osób poniżej 18-go roku życia ze względu na brak danych o bezpieczeństwie i skuteczności.

Działanie:

Leczenie Lipanthylem wdrażane jest w celu obniżenia stężenia cholesterolu we krwi oraz poziomu trójglicerydów.

Skład:

1 kapsułka zawiera 267 mg fenofibratu mikronizowanego.

Przeciwwskazania:

Nie zawsze stosowanie leku jest korzystne dla pacjenta. Istnieje szereg przeciwwskazań, aby nie stosować Lipanthylu.

- Niewydolność wątroby
- Nadwrażliwość na substancję czynną
- Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą
- Ciężka niewydolność nerek
- Znana choroba pęcherzyka żółciowego
- Przewlekłe lub ostre zapalenie trzustki z wyjątkiem ostrego zapalenia trzustki spowodowanego ciężką hipertrójglicydemią
- Uczulenie na światło lub reakcje fototoksyczne podczas stosowania fibratów lub ketoprofenu.

Działania niepożądane:

Szczegółowa lista działań niepożądanych zgłaszanych przez pacjentów w trakcie stosowania leczenia, znajduje się na ulotce dołączonej do opakowania. W trakcie wystąpienia któregośkolwiek z objawów, skonsultuj się z lekarzem.

Najczęstszymi zgłaszanymi są:

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego
- Zaburzenia układu immunologicznego
- Zaburzenia układu nerwowego
- Zaburzenia naczyniowe
- Zaburzenia żołądka i jelit
- Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
- Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe
- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.