

Loceryl lakier 2,5ml 5%

Nasza cena: 118,37 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|-----------------------|
| Dawka | 5% |
| Opakowanie | 2,5ML |
| Postać | LAKIER |
| Producent | Galderma Laboratoires |
| Rejestracja | Lek bez recepty |

Opis produktu

Opis

Substancją czynną preparatu jest amorolfina. Jest to substancja o działaniu przeciwgrzybiczym, skuteczna wobec wielu gatunków dermatofitów, pleśni, a także drożdżaków i niektórych innych grzybów chorobotwórczych. Działanie amorolfiny, podobnie jak leków przeciwgrzybiczych z grupy pochodnych imidazolu i triazolu, prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórek grzyba. Po podaniu miejscowym na płytkę paznokciową amorolfina niszczy grzyby znajdujące się w łożysku paznokcia. Wchłanianie substancji czynnej do krwi jest znikome. Nawet długotrwałe stosowanie preparatu w postaci lakieru do paznokci nie prowadzi do kumulowania się leku w organizmie.

Wskazania:

Preparat jest wskazany w miejscowym leczeniu grzybicy paznokci wywołanej przez dermatofity, drożdżaki czy pleśnie, bez zajęcia macierzy paznokcia i ograniczonej do 2 płytek paznokciowych.

Sposób użycia:

Preparat ma postać leczniczego lakieru do paznokci i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na zmienione chorobowo paznokcie dłoni lub stóp. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:

Stosować miejscowo, na zakażony paznokieć 1 raz na tydzień.

Powierzchnię paznokcia należy opłukać za pomocą dołączonego pilniczka oraz oczyścić i odtłuścić za pomocą dołączonych gazików

nasączonych alkoholem izopropylowym. Przy kolejnych zastosowaniach paznokcie należy także dokładnie oczyścić z pozostałości lakieru za pomocą pilniczka i gazików. Lakier należy nanosić na całą powierzchnię zmienionego paznokcia. Przed nałożeniem lakieru na każdy kolejny paznokieć należy zanurzyć szpatułkę w buteleczce z lakierem i nie wycierać szpatułki o brzeg buteleczki. Lakier po nałożeniu pozostawić do wyschnięcia na 3–5 minut. Szpatułkę po użyciu należy wyczyścić używając tego samego gazika, którym wcześniej czyszczona była płytka paznokcia. Pilniczki używanych do zakażonych paznokci nie wolno używać do zdrowych paznokci.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.