

Lopacut, 2 mg, 10 tabletek powlekanych



Nasza cena: 6,69 zł

Opis słownikowy

Dawka	2MG
Opakowanie	*10
Postać	TABL.POWL.
Producent	VITABALANS OY FINLANDIA [FI]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	LOPERAMIDUM

Opis produktu

Opis

Lopacut zawiera chlorowoderek loperamidu. Należy do grupy leków przeciwbiegunkowych.

Lopacut stosowany jest:

- w celu złagodzenia objawów nagłej, krótkotrwałej biegunki (ostra biegunka) u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Lopacut powoduje, że stolec jest bardziej twardy oraz zmniejsza częstość wypróżnień.
Lekarz może przepisać ten lek również na inne dolegliwości.

Przeciwwskazania:

- Jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na loperamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lopacut
- Jeśli w stolcu występuje krew lub jeśli bieguncie towarzyszy wysoka gorączka
- Jeśli pacjent ma zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa lub pseudomembranous colitis po terapii antybiotykowej),
- Jeśli pacjent ma bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter,
- Jeśli u pacjenta występuje spowolniony pasaż pokarmu przez jelita, np. jeśli występują zaparcia,
- Jeśli pacjent ma na rozdęcia brzucha,
- Jeśli u pacjenta występuje długotrwała biegunka (przewlekła biegunka).

Sposób stosowania:

Lek Lopacut należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli pacjent nie jest pewien jak stosować lek, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Początkowo 2 tabletki a następnie 1 tabletkę po każdym luźnym stolcu, jednak nie wcześniej niż 2-3 godziny po przyjęciu dawki początkowej. Maksymalna dawka dobową nie powinna być większa niż 6 tabletek w przypadku dorosłych (maksymalna dawka dobową to 12 mg) i 4 tabletki w przypadku młodzieży (maksymalna dawka to 8 mg). Nie należy stosować leku Lopacut dłużej niż 2 dni bez konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lopacut

Jeśli pacjent zastosował zbyt dużą dawkę leku Lopacut lub jeśli dziecko zażyło lek przez przypadek, należy skontaktować się z lekarzem lub szpitalem, aby uzyskać informacje o ryzyku i dalszym postępowaniu.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Lopacut może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Lopacut i skonsultować się z lekarzem jeśli wystąpią następujące objawy:

- Obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, problemy z przełykaniem i oddychaniem (obrzęk naczynioruchowy) i (lub) pokrzywka
- Silne podrażnienie, zaczerwienienie lub pęcherze na skórze, wargach, powiekach i narządach płciowych (wysypka pęcherzowa, w tym zespół Stevensa - Johnsona, rumień wielopostaciowy i martwica toksyczno-rozplywna naskórka).

Poniższa lista dotyczy zgłaszanych działań niepożądanych przedstawionych zgodnie z częstością występowania.

Często (może wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 100):

- zaparcia
- wzdęcia
- skurcze i kolki brzuszne
- nudności
- zawroty głowy
- ból głowy

Niezbyt często (może wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 1 000):

- senność
- suchość w jamie ustnej
- ból brzucha
- uczucie dyskomfortu w brzuchu
- ból górnej części brzucha
- wymioty
- niestrawność
- wysypka

Rzadko (może wystąpić u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

- utrata świadomości
- brak krytycznych funkcji poznawczych i obniżenie poziomu świadomości (osłupienie)
- obniżony poziom świadomości
- zwiększenie napięcia mięśniowego (hipertonie)
- zaburzenia koordynacji
- zwężenie źrenic (mioza)
- problemy z oddawaniem moczu (zatrzymanie moczu)
- niedrożność jelit
- wzdęcie (rozdęcie brzucha)
- powiększona okrężnica (toksyczne rozszerzenie okrężnicy)
- reakcje alergiczne (nadwrażliwości)
- pokrzywka
- świąd
- szybko postępujący obrzęk twarzy, warg, języka i gardła (obrzęk naczynioruchowy)

- ciężka postać zmian na skórze i błonach śluzowych (wysypka pęcherzowa)
- uczucie zmęczenia

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- senność

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Więcej na temat produktu dowiedzie się Państwo ze strony

<http://www.vitabalans.fi/pl/produkt/lopacut-2-mg/>

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.