

Lorista 50 mg 28 tabletek

Nasza cena: 6,30 zł

Opis słownikowy

Dawka	50MG
Opakowanie	*28
Postać	TABL.POWL.
Producent	KRKA PHARM.D.D. NOVO MESTO SŁOWENIA [SI]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	LOSARTANUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt jest zalecany do stosowania w celu:

- leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego
- leczenia chorób nerek u pacjentów dorosłych z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.
- leczenia przewlekłej niewydolności serca
- zmniejszenie ryzyka udaru mózgu u pacjentów dorosłych z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca

Dawkowanie:

Lek powinien być stosowany pod kontrolą lekarza i według jego zaleceń. Zazwyczaj stosuje się dawkę:

Nadciśnienie tętnicze:

- zarówno dawka początkowa jak i dawka podtrzymująca wynosi 50 mg na dobę.
- maksymalny efekt działania można uzyskać po 3 – 6 tygodniach stosowania leku

Niewydolność serca:

- dawka początkowa wynosi 12,5 mg na dobę.
- dawkę można stopniowo zwiększać do dawki, która przynosi pożądany efekt (maksymalnie 50 mg na dobę)

Działanie:

Losartan jest syntetycznym, doustnym, niepeptydowym, wybiórczym antagonistą receptorów angiotensyny II (typu AT1). Angiotensyna II wiąże się z receptorami AT1, które znajdują się w licznych tkankach (np. mięśniach gładkich naczyń krwionośnych, gruczole nadnerczowym, nerkach i sercu) wywołując liczne, ważne działania biologiczne, włącznie ze zwężeniem naczyń i uwalnianiem aldosteronu. Angiotensyna II przyspiesza także proliferację komórek mięśni gładkich.

Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 50 mg soli potasowej losartanu.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeżeli u pacjenta występuje nadwrażliwość na losartan potasowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Innym przeciwwskazaniem do stosowania leku jest ciąża i laktacja oraz ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Działania niepożądane:

Podczas stosowanie leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane do najczęstszych z nich należą:

- zawroty głowy,
- senność,
- bóle głowy,
- zaburzenia snu,
- kołatanie serca,
- dławica piersiowa,
- osłabienie,
- zmęczenie,
- obrzęki/opuchlizny,
- hiperkaliemia,
- hiperglikemia.

Działania niepożądane nie muszą występować u każdego z pacjentów. W celu poznania innych działań niepożądanych należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania lub też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.