

# Lozap HCT 50 mg + 125 mg 30 tabletek

Nasza cena: 7,13 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,05G+0,0125G
Opakowanie	*30
Postać	TABL.POWL.
Producent	ZENTIVA K.S. CZECHY [CZ]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	LOSARTANUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Produkt jest wskazany do stosowania w celu leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego u pacjentów.

### Dawkowanie:

- produkt powinien być stosowany pod ścisłą kontrolą lekarza prowadzącego i według jego zaleceń.
- leku nie należy stosować jako produkt początkowy w walce z nadciśnieniem tętniczym
- dawka leku powinna być ustalona indywidualnie dla każdego pacjenta
- zazwyczaj stosuje się dawkę podtrzymującą, która wynosi 1 tabletkę raz na dobę.
- jeżeli istnieje taka konieczność dawkę tą można zwiększyć do 2 tabletek na dobę.
- należy pamiętać iż nie powinno się przekraczać maksymalnej zalecanej dawki do spożycia która wynosi 2 tabletki.
- działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 3-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

### Działanie:

- zwiększa wydalanie kwasu moczowego z moczem,
- zwiększa stężenia kwasu moczowego w surowicy,

- zmniejsza hiperurykemię.

## Skład:

1 tabletkę powlekana produktu leczniczego zawiera 50 mg losartanu potasowego oraz 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

## Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancje czynne, substancje będące pochodnymi sulfonamidu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- hipokaliemia lub hiperkalcemia odporne na leczenie,
- ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
- zastój żółci,
- zaburzenia związane z niedrożnością dróg żółciowych,
- hiponatremia oporna na leczenie,
- hiperurykemia objawowa/dna,
- II i III trymestr ciąży,
- ciężkie zaburzenia czynności nerek,
- bezmocz.

## Działania niepożądane:

Działania niepożądane mogą występować tylko u części pacjentów stosujących lek. U każdego z pacjentów działania te mogą przebiegać w różny sposób.

### Do najczęstszych działań niepożądanych należą:

- bezsenność,
- niepokój,
- ból głowy,
- zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego,
- kaszel,
- zapalenie zatok,
- zaburzenie zatok,
- ból brzucha,
- nudności,
- biegunka,
- niestrawność,
- kurcze mięśni,

- ból pleców,
- ból nóg,
- ból mięśni,
- zaburzenia czynności nerek,
- niewydolność nerek,
- osłabienie,
- zmęczenie,
- ból w klatce piersiowej.

Więcej informacji na temat innych działań niepożądanych zostało zawarte w ulotce dołączonej do opakowania leku. Wszelkich niezbędnych porad może również udzielić lekarz prowadzący lub też farmaceuta. Należy pamiętać, że jeżeli u pacjenta wystąpią którekolwiek z działań niepożądanych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

**Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**