

# Luteina 100 mg 30 tabletek dopochwowych

Nasza cena: 21,75 zł

## Opis słownikowy

Dawka	100MG
Opakowanie	*30
Postać	TABL.DOPOCH.
Producent	ADAMED SP.Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	PROGESTERONUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

Luteina jest zalecana: w stanach niedoboru endogennego progesteronu pod postacią zaburzeń cyklu miesięczkowego, cykli bezowulacyjnych, bolesnego miesięczkowania, zespołu napięcia przedmiesiączkowego i czynnościowych krwawień macicznych; w leczeniu endometriozy; programach zapłodnienia in vitro. W leczeniu niepłodności związanej z niedomogą lutealną; w leczeniu poronień nawykowych i zagrażających. W leczeniu niewydolności fazy lutealnej okresu przedmenopauzalnego; w ramach hormonalnej terapii zastępczej, u kobiet po menopauzie z zachowaną macicą, celem ochrony endometrium.

### Dawkowanie:

Dawkowanie progesteronu powinno być każdorazowo ustalane indywidualnie w zależności od wskazań oraz odpowiedzi terapeutycznej.

### Działanie:

Progesteron w produkcie, 100 mg, tabletki jest syntetycznie otrzymywanym hormonem identycznym z naturalnym hormonem ciała żółtego jajnika.

### Skład:

1 tabletki dopochwowa zawiera 100 mg progesteronu.

### Przeciwwskazania:

Tabletki nie stosuje się u osób, u których występuje którykolwiek z następujących stanów klinicznych: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Krwawienie z pochwy nieznanego pochodzenia, poronienie zatrzymane, ciąża pozamaciczna; nowotwór lub podejrzenie nowotworu piersi lub dróg rodnych; zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub ciężkie zakrzepowe zapalenie żył, zarówno czynne jak i przebyte w przeszłości; ciężkie zaburzenia czynności lub choroba wątroby; tabletki nie należy również stosować w okresie karmienia piersią.

### **Działania niepożądane:**

Podczas stosowania progesteronu, który jest identyczny z hormonem endogennym, działania niepożądane występują sporadycznie. Zaburzenia układu nerwowego: senność; bóle i zawroty głowy; zaburzenia koncentracji i uwagi; uczucie lęku; stany depresyjne; zaburzenia układu rozrodczego i piersi; zaburzenia dotyczące pochwy.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.