

Maalox, (400mg + 400 mg), tabletki, 40 szt.



Nasza cena: 19,84 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,4G
Opakowanie	*40
Postać	Tabletki
Producent	Sanofi-Aventis Francja [Fr]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ALUMINII HYDROXYDUM, MAGNESII HYDROXIDUM

Opis produktu

Opis

Maalox jest lekiem złożonym o miejscowym działaniu zobojętniającym nadmiar kwasu solnego soku żołądkowego, osłaniającym i ściągającym błonę śluzową żołądka i dwunastnicy.

Skład

1 tabletkę zawiera 400 mg wodorotlenku magnezu i 400 mg wodorotlenku glinu; substancje pomocnicze: mannitol, sorbitol, sacharyna sodowa, aromat miętowy, stearynian magnezu, sacharoza, sacharoza zawierająca 3% skrobi

Działanie

Preparat złożony, zawierający wodorotlenki glinu i magnezu o miejscowym działaniu zobojętniającym i osłaniającym błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. Działanie zobojętniające polega na neutralizowaniu lub buforowaniu kwasu solnego z żołądka.

Wskazania - Maalox, (400mg + 400 mg), tabletki, 40 szt.

Preparat stosowany w leczeniu objawowym zaburzeń ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, związanych z nadkwaśnością: nieżycie żołądka, zarzucaniu wstecznym treści żołądka do przełyku w przebiegu przepukliny rozworu przełykowego,

niestrawności, zgadze z powodu nadkwaśności, oraz pomocniczo w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Dawkowanie - Maalox, (400mg + 400 mg), tabletki, 40 szt.

1-2 tabletki po posiłku lub w czasie bólu. Tabletki należy ssać lub żuć.

Przeciwwskazania - Maalox, (400mg + 400 mg), tabletki, 40 szt.:

Nadwrażliwość na wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu lub którykolwiek składnik preparatu. Ciężka niewydolność nerek.

Działania niepożądane:

Bardzo rzadko: zaparcia, biegunka, nudności, wymioty, jasne zabarwienie stolca. Po długotrwałym stosowaniu przy niedostatecznej podaży fosforanów objawy hipofosfatemii oraz niewydolność nerek (na skutek odkładania się fosforanu amonowo-magnezowego), a u chorych dializowanych może spowodować lub nasilić osteomalację, a także zwiększyć ryzyko encefalopatii.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.