

## Maalox, 400mg, tabletki, 20 szt.



Nasza cena: 10,78 zł

### Opis słownikowy

Dawka	0,4G
Opakowanie	*20
Postać	Tabletki
Producent	RHONE-POULENC RORER FRANCJA [FR]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ALUMINII HYDROXYDUM, MAGNESII HYDROXIDUM

### Opis produktu

#### Opis

Maalox jest lekiem złożonym o miejscowym działaniu zobojętniającym nadmiar kwasu solnego soku żołądkowego, osłaniającym i ściągającym błonę śluzową żołądka i dwunastnicy.

#### Dawkowanie - Maalox, 400mg, tabletki, 20 szt.

Doustnie: 1-2 tabletki po posiłku lub w czasie bólu. Tabletki należy ssać lub żuć. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

#### Składniki - Maalox, 400mg, tabletki, 20 szt.

1 tabletki zawiera 400 mg wodorotlenku magnezu i 400 mg wodorotlenku glinu; substancje pomocnicze: mannitol, sorbitol, sacharyna sodowa, aromat miętowy, stearynian magnezu, sacharoza, sacharoza zawierająca 3% skrobi.

#### Działania

Preparat złożony, zawierający wodorotlenki glinu i magnezu o miejscowym działaniu zobojętniającym i osłaniającym błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. Działanie zobojętniające polega na neutralizowaniu lub buforowaniu kwasu solnego z żołądka.

#### Wskazania - Maalox, 400mg, tabletki, 20 szt.

Preparat stosowany w leczeniu objawowym zaburzeń ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, związanych z nadkwaśnością: nieżyty żołądka, zarzucaniu wstecznym treści żołądka do przełyku w przebiegu przepukliny roztworu przełykowego, niestrawności, zgadze z powodu nadkwaśności, oraz pomocniczo w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

#### Przeciwwskazania - Maalox, 400mg, tabletki, 20 szt.

Nadwrażliwość na wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu lub którykolwiek składnik preparatu. Ciężka niewydolność nerek.

### Przeciwwskazania - Maalox, 400mg, tabletki, 20 szt.

Bardzo rzadko: zaparcia, biegunka, nudności, wymioty, jasne zabarwienie stolca. Po długotrwałym stosowaniu przy niedostatecznej podaży fosforanów objawy hipofosfatemii oraz niewydolność nerek (na skutek odkładania się fosforanu amonowo-magnezowego), a u chorych dializowanych może spowodować lub nasilić osteomalację, a także zwiększyć ryzyko encefalopatii.

### Uwagi

Wskazówka dla pacjentów chorych na cukrzycę: 1 tabletkę zawiera 150 mg sacharozy. Ze względu na obecność sorbitolu, leku nie należy stosować u pacjentów u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**