

Magne B6, 50 tabletek



Nasza cena: 17,55 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	Sanofi-Synthelabo Sp.z O.o. Rzeszów
Rejestracja	Lek bez recepty

Opis produktu

Opis

Magne B6 stosowany jest kiedy zostają stwierdzone: niedobór magnezu, czynnościowe objawy niedoboru (m.in. tężyczka utajona), profilaktyka. Wspomagająco w miażdżycy, nadciśnieniu, chorobie niedokrwiennej serca, padaczkę.

Dawkowanie - Magne B6, 50 tabletek

Dorośli doustnie w stwierdzonym niedoborze magnezu 6 tabl. powł. dziennie w 2-3 dawkach. Wspomagająco w tężyczce utajonej 4 tabl. powł. dziennie w 2-3 dawkach (lek należy popić szklanką wody). Dorośli w profilaktyce 2-4 tabl. powł. dziennie. Dzieci 4-12 r.ż. w stwierdzonym niedoborze magnezu do 4 tabl. powł. dziennie w 2-3 dawkach.

Składniki - Magne B6, 50 tabletek

1 tabl. powł. zawiera 470 mg mleczanu magnezu (48 mg Mg) i 5 mg witaminy B6.

Działania

Preparat przeciwstresowy, uzupełniający niedobór magnezu w organizmie. Magnez jest makroelementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania komórek; zmniejsza pobudliwość i skurcze mięśniowe. Witamina B6 (pirydoksyna) zwiększa syntezę GABA, który pełni funkcję neuroprzekaźnika w organizmie, oraz ułatwia wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. Dzięki synergicznemu działaniu obu składników preparat usuwa stany niepokoju o podłożu psychicznym lub somatycznym, nie upośledzając zdolności uczenia się i koncentracji. Zapobiega także stresom, bólom i zawrotom głowy.

Wskazania - Magne B6, 50 tabletek

Stwierdzony niedobór magnezu, czynnościowe objawy niedoboru (m.in. tężyczka utajona), profilaktyka. Wspomagająco w miażdżycy, nadciśnieniu, chorobie niedokrwiennej serca, padaczkę.

Przeciwwskazania - Magne B6, 50 tabletek

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min). Nie stosować łącznie z lewodopą, solami wapnia, fosforanami. Podczas leczenia tetracyklinami należy zachować 3-godzinną przerwę między podaniem preparatu a antybiotykiem.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.