

Magnefar B6 Bio 50 tabletek

Nasza cena: 17,82 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	MAGNESIUM, PYRIDOXINUM

Opis produktu

Opis

Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego oraz wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Jego obecność jest niezbędna w prawidłowym przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Ponadto pełni biologiczną rolę polegającą na aktywacji szeregu enzymów.

Wskazania:

Leczenie i profilaktyka niedoboru magnezu, które mogą objawiać się: nerwowością, drażliwością, wahaniami nastroju, odczuwaniem łagodnego lęku z towarzyszącym kołataniem serca, niepokoju, przejściowego uczucia zmęczenia, ospałością, zaburzeniami snu o niewielkim nastroju, skurczami mięśni, mrowieniem, czy drganiem powiek. Uzupełnienie niedoboru magnezu może złagodzić powyższe objawy. Kontynuowanie leczenia nie jest zalecane w przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania. Lek stosuje się u osób dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat i powyżej.

Dawkowanie:

Dorośli: 5 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 podzielonych dawkach. Dzieci i młodzież: wiek 6-14 lat, masa ciała 21-30kg: 3 do 4 tabletek na dobę w 2 lub 3 podzielonych dawkach; wiek 6-14 lat, masa ciała 31-39kg: 4 do 5 tabletek na dobę w 2 lub 3 podzielonych dawkach; wiek 14-18 lat, masa ciała powyżej 40kg: 5 do 6 tabletek na dobę w 2 lub 3 podzielonych dawkach. Lek należy przyjmować podczas posiłku, popijając dużą ilością wody (jedna szklanka).

Składniki:

Substancją czynną leku są magnezu cytrynian i pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6). Jedna tabletki powlekana zawiera 60mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnezii citras) oraz 6,06mg pirydoksyny chlorowodoru (Piridoxini hydrochloridum). Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna

bezwodna, magnezu stearynian; otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E171), glicerolu monokaprylokapronian (typ 1), sodu laurylosiarczan.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.